

中國化學

衛署藥製字第 012051 號
024132 號

安莫西林膠囊

250 毫克 500 毫克

250mg

500mg

Amoxicillin

Capsules

C.C.P.

綱號：B21

B32

Amoxicillin 為半合成的抗生素，安全又具廣效的殺菌作用，為較 Ampicillin 更進步的 Penicillin 同類物。

成分：每膠囊含有：Amoxicillin Trihydrate

eq. to Amoxicillin 250mg, 500mg(Potency)

優點：胃酸中安定，所以無須配合進食時間。除了腦部和脊髓液，它都能分佈到大多數的組織與體液。約 60% 在六小時內以原形由尿排出，在血清中有 20% 為蛋白結合態，若同時服用 Probenecid 可延緩其排泄。

適應症：

葡萄球菌，鏈球菌，肺炎雙球菌，腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。

效能與用法：

	病原菌種	適應症	用法
上呼吸道感染症	由 Streptococci , Pneumococci , Nonpenicillinase producing Staphylococci , H. influenzae 引起者	中耳炎，鼻竇炎，咽喉炎，扁桃腺炎。	成人：250mg~500mg 每 8 小時一次 小孩：20mg~40mg / 公斤 / 日，每 8 小時一次 若小孩體重達 20 公斤以上，則依成人劑量投藥。
生殖泌尿道感染症	由 E. coli , Proteus mirabilis , Streptococcus faecalis 引起者	膀胱炎，腎盂炎，尿道炎。	
皮膚及軟部組織感染症	由 Streptococci , Staphylococci , E. coli 引起者。	癰疽瘍瘻，蜂窩狀組織炎，外傷，骨髓炎，心內膜炎，膽囊炎。	

	病原菌種	適應症	用法
下呼吸道感染症	由 Streptococci , Pneumococci , H. influenzae , 引起者	急慢性支氣管炎，肺炎。	成人：500mg 每 8 小時一次 小孩：40mg / 公斤 / 日，每 8 小時一次 若小孩體重達 20 公斤以上，則依成人劑量投藥。
淋病與急性無併發症之生殖泌尿系感染症	由 N. gonorrhoeae 引起者 (男女性皆同)	淋病。	成人：3gm 作單一口服劑量使用，疑有梅毒之淋病患者，須作 Darkfield 檢查，治療後應至少四次按月作血清試驗。

禁忌：

對盤尼西林曾有過敏反應者不宜使用。

注意事項：

長期治療使用時，須定期作肝臟、腎臟和造血機能檢查。治療期間若復感染黴菌性或細菌性病原時，須適時停藥，再建立新的治療體系。本藥須由醫師處方使用。

副作用：

除了對青黴素過敏者外無嚴重的副作用，若有胃腸不適發生，亦極輕微罕見。

貯存：室溫、遮光貯存。

包裝：

250mg 6~1000 粒膠囊瓶裝、PTP 鋁箔盒裝。

500mg 6~1000 粒膠囊瓶裝/盒裝。



中國化學製藥股份有限公司

CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.

總公司：台北市襄陽路 23 號 TEL：

(02)23124200

台中工廠：台中市工業區 15 路 10 號 ①