

薩多心錠 2 公絲 Xadosin Tablets 2 mg

網號：C67

成分名：Doxazosin mesylate

劑型、含量：Each Tablet contains：
Doxazosin (mesylate).....2 mg

臨床藥理：

1.藥效學特性：

本藥經由選擇性和競爭性的阻斷突觸後 α_1 -腎上腺素受體而產生血管擴張作用。經由降低全身血管阻力，而達到明顯降血壓的效果，且 1 天服用 1 次可有效維持 24 小時的降壓效果，一般降壓作用於服藥後 2~6 小時達最高點。高血壓病人於服用本藥期間，其仰臥和站立姿勢的血壓相近。不像其它非選擇性 α -腎上腺素受體抑制劑。長期服用本藥少見血漿腎素活性的提高或心悸的產生。本藥能產生有利的脂質代謝作用，可明顯提高 HDL / Total Cholesterol 比例，降低 Total Triglycerides 和 Total Cholesterol 的量。這是利尿劑和 β -腎上腺素阻斷劑所沒有的優點，前二者對脂質代謝有不良作用，由於高血壓和脂質與冠狀動脈心臟疾病有關，本藥對二者具有利的作用效果，因此能降低引發冠狀動脈心臟病的危險性。使用本藥治療時能減少左心室肥大，抑制血小板凝集和增強組織胺素原活化劑的活性，此外，本藥還能改善胰島素功能不良病人對胰島素的敏感性。本藥不會產生不良的代謝作用，因此也適用於伴有氣喘、糖尿病、左心室功能不良、痛風、良性前列腺腫和老年的高血壓病人。

2.藥動學特性：

(1)吸收：本藥口服後吸收良好，約 2 小時可達血中最高濃度。對於老年人及腎功能欠佳的病人之藥動學和年輕且腎功能正常者無明顯差異，目前尚未對肝功能不良的病人做試驗，也未對影響肝臟代謝的藥物（例如 Cimetidine）等進行藥品作用研究。

(2)代謝/排泄：本藥其末端血漿半衰期為 22 小時，所以 1 天只需服用 1 次，本藥大多會被代謝，只有小於 5% 以原型排出。

適應症：高血壓、良性前列腺肥大。

說明：

1.本藥可做為治療高血壓的第一線用藥，病人若單獨使用一種降血壓藥，而無法達到療效時，本藥可和 Thiazide 類利尿劑、 β -阻斷劑、鈣離子拮抗劑或血管加壓素轉化酶抑制劑併用。

2.本藥可適用於尿流阻塞與因為良性前列腺肥大所引起的阻礙症狀（例如：遲尿、間歇滴尿、尿流減弱、膀胱排空不完全）及不適症狀（例如：夜尿、白天次數增加、灼熱感）。本藥可用於所有高血壓或正常血壓而患有良性前列腺肥大的病人。以本藥對於高血壓伴有良性前列腺肥大的病人做單一療法後，發現本藥可快速改善症狀，且 66~71% 病人的尿流速率。在 14 星期的雙盲研究及 2 年的開放式研究中，本藥皆可持續地改善病人的症狀。

用法、用量：*本藥須由醫師處方使用。

1.高血壓：治療高血壓的劑量範圍是每日 1~16 公絲，起始劑量為 1 公絲，1 天 1 次，然後按照病人的反應，每隔 1~2 星期將每日劑量調整為 2 公絲、4 公絲、8 公絲或 16 公絲（最大劑量），至病人血壓降至理想狀態，一般使用的劑量為每天 2 至 4 公絲。

2.良性前列腺肥大：治療良性前列腺肥大之劑量範圍為每日 1~8 公絲，起始劑量為 1 公絲，1 天 1 次，然後根據病人的排尿力學及良性前列腺肥大的症狀，每隔 1~2 星期將每日劑量調整為 2 公絲、4 公絲甚至 8 公絲，在給藥期間必須定時地評估病人的血壓。

3.腎功能不良病人之使用：因為本藥的藥物動力學在腎功能的病人沒有改變，亦無證據顯示本藥會惡化腎機能不良的情況，因此腎功能不佳的病人可依照一般劑量給與。

4.小孩之使用：目前尚無小孩使用之經驗。

禁忌、警語及應注意事項：

1.禁忌：本藥禁用於對 Quinazolines 類藥物過敏的病人。

2.開車及操作機械之影響：使用本藥會減弱患者駕駛及機械操作能力，尤其是在服藥初期。

3.孕婦及授乳婦：在動物試驗中，大約 300 倍之人體最高劑量會降低胎兒的存活率，雖然未發現畸胎現象，但是懷孕或授乳期使用本藥的安全性尚未建立，因此孕婦或授乳婦應在醫師認為對母親及胎兒利多於弊時，才可使用本藥。

4.過量如果服用過量產生低血壓時，病人應仰臥，頭部放低。如果需要的話，也可使用其它支持性療法，但是由於和蛋白質結合率頗高，所以不能使用透析法除去。

交互作用：

大部份（約 98%）血漿中的 Doxazosin 都會和蛋白質結合。體外實驗資料顯示，本藥並不會影響 Digoxin、Warfarin、Phenytoin 或 Indomethacin 和蛋白質的結合。本藥也不會和 Thiazide 利尿劑、 β -blockers、Furosemide、抗生素、非類固醇抗炎劑、口服降血糖藥、促尿酸排泄劑或抗凝血劑等產生不良之藥物交互作用。

副作用：

1.對照臨床試驗顯示，高血壓病人使用本藥後最常見的不良反應為姿勢性（少與量厥有關）或非特異性的頭昏、頭痛、疲勞不適、姿勢性頭昏、暈眩、水腫、虛弱、嗜眠、噁心及鼻炎。

2.極少數的病例，有尿失禁現象，此現象可能與本藥的藥理作用有關。

3.下列的不良反應為本藥治療高血壓曾被報告過之症狀，這些症狀在未服用本藥時亦可能發生於高血壓之病人：例如：心跳過速、心悸、胸痛、心絞痛、心肌梗塞、腦血管病變及心律不整。

保存條件：請保存於室溫、陰涼、乾燥及小孩接觸不到之處。

包裝：4~1000 粒塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。



中國化學製藥股份有限公司

CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.

總公司：台北市襄陽路 23 號 TEL: (02)23124200

新豐工廠：新竹縣新豐鄉坑子口 182-1 號 B