

“中國化學”

5-羥基色氨酸膠囊 100 公絲

5-HTP Capsule 100 mg “C.C.P.C.”
(Oxipriptan)

網號：

B43

成分：Each Capsule contains：

Oxipriptan.....100mg

適應症：治療 BH4 缺乏型苯酮尿症患者。

用法、用量：本藥須由醫師處方使用。

1. 本劑之用量乃視病患症狀跡象與個人反應而定，遵照醫囑，每天可服用 1~3 顆。
2. 若每天必須服用高劑量時，建議遵照下列指示：
第 1 至 3 天：晚上服用 1 顆。第 4 至 6 天：早、晚各服用 1 顆。自第 7 天起：早、午、晚各服用 1 顆。本劑請於用餐時服用。

注意事項：服用本劑治療時，注意如下：

1. 若定時定量服用，數天之後療效才有明顯反應。
2. 服用至少持續三個月。
3. 服用不得突然間斷。
4. 服用期間須視病患個人情況而定，並由醫生診斷。

副作用：一時的血壓上升或下降、胃腸不適，如噁心嘔吐及腹瀉，這些皆由本劑特別使用過量所引發的副作用。不過，在持續的治療下或日漸用量減少，這些徵狀多半可逐漸消失。另外，須注意催乳激素的血漿含量(prolactin-the level of plasma)的上升。大體上，此藥劑在定量使用下，人的反應能力也會受改變，尤其駕

駛或操作機械能力會受不良影響。若和酒一起發生作用，影響更大。

禁忌症：

1. 具有 Serotonin 過量之病徵，嚴重的腎機能不健全者禁止使用。
2. 因為本劑會影響血壓，所以針對患有血壓疾病的病人必須多加考量治療上的利弊得失。
3. 雖對本劑有害特性的發現並不明顯，不過醫生在面對孕婦時，本劑的使用尤其更加小心衡量可能性之風險是否低於治療上之效益。

交互作用：與 Monoaminooxidase inhibitor 同時服用時，Monoaminooxidase inhibitor 的效果會增強，抗抑鬱劑或鋰鹽會影響本劑，而強化效果。若有病人還同時接受其他藥物治療，而那些藥物(例如 Digitoxin)會明顯產生與血漿蛋白(plasma protein)高度結合時，interactions (指作用加強)的發生是可預期的。另一方面，若有病患還同時接受其他藥物治療，而那些藥物可能阻礙 Oxipriptan 的 Decarboxylation(例如 Methyldopa, Benserazide 和 Carbidopa)，則必須謹慎服用本劑。此外，與抗 Serotonin 的藥劑，如 Cyproheptadine, Methysergide, Pizotifen 一起服用時亦加小心。

貯存：遮光、密封、避免日光直射，室溫下貯存。

包裝：2~1,000 粒塑膠瓶裝。



中國化學製藥股份有限公司

CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.

總公司：台北市襄陽路 23 號 TEL：

(02)23124200

新豐工廠：新竹縣新豐鄉坑子口 182-1 號 B