

“中國化學”

優淨膜衣錠 500 公絲(塞浦弗洒辛)**Ciflodol F.C. Tablets 500 mg**

“C.C.P.C.” (Ciprofloxacin)

網

號：E81

本劑主成分 Ciprofloxacin 是一種較新的 Quinolone 類抗菌劑，具廣效強力抗菌作用，其獨特的作用機序，會抑制 DNA gyrase 和阻礙細菌正常代謝，因此對 aminoglycosides, penicillins, cephalosproins, tetracyclines 以及其它抗生素有抗藥性的菌種，亦具有優異的療效。

成分：每錠含有：

Ciprofloxacin(as hydrochloride)··· 500mg(Potency)

臨床藥理：

1. 本劑絕對生理可用率約為 70~80%，口服後 60~90 分鐘達最高血中濃度，約 20%與蛋白質結合，其半衰期約為 3.5~4.5 小時，在 24 小時中，約有 30 至 50%口服及劑量經尿液排出。

2. 本劑在感染部位之體液及組織，呈高濃度，一天只需服用二次，早晚各一。

適應症：對 Ciprofloxacin 有感受性之細菌所引起之呼吸道感染、中耳炎、竇炎、眼感染、腎臟及泌尿道感染(包括淋病)、腹部感染(包括腹膜炎)、皮膚及軟組織感染、骨髓炎、關節感染、菌血症。用法：用量：本藥須由醫師處方使用。

注意：藥片與少許液體同時吞下，不必配合三餐時間服用。空腹服用，會加強主成分吸收。

1. 除非醫師另有指示，其成人一般劑量如下：

非併發性泌尿道感染：每次 125 毫克，每日二次。

併發性泌尿道感染：每次 250~500 毫克，每日二次。

呼吸道感染如支氣管炎：每次 250~500 毫克，每日二次。

其他感染(請參考適應症)：每次 500 毫克，每日二次。

2. 其他說明：

由假單胞菌屬、葡萄球菌或肺炎鏈球菌引起的致命感染(如再發性之膠稠性黏液病、肺炎、腹腔、骨骼及關節等之感染症)，若無法以靜脈注射輸藥，則口服單劑可增至 750 毫克，每日二次。

急性淋病及婦女急性非併發性膀胱炎以單劑量 250mg 治療即可。

依病情嚴重及 Creatinine 之廓清值，老邁病人儘可能採最低劑量。

警語：

1. 對老年人使用本劑應慎重。

2. 癲癇及中樞神經系統受損者(例如：低痙攣值(lowered convulsion threshold)、曾有痙攣病史、腦血流減少、腦組織變異、中風)，只有在其治療效果超過危險性時，才得使用本劑。

禁忌：

1. 對本劑或其他 Quinolone 類藥物會過敏者，請勿使用。

2. 對成長中之幼兒及孕婦、授乳婦的安全性尚未確定，且動物實驗所顯示對未發育完全之關節軟骨造成傷害之可能，尚無法完全排除，所以禁止投與。動物實驗證實無畸胎之副作用。

副作用：

1. 腸胃道：偶有噁心、下痢、嘔吐，消化不良、腹部疼痛、胃腸氣積、食慾不振。

2. 神經系統：偶有暈眩、頭痛、倦怠感、失眠、興奮、震顫。極少發生週邊痛覺異常、流汗、步伐不穩、痙攣、不安、夢魘、混亂、抑鬱、幻覺、味嗅覺障礙、視覺障礙。

3. 過敏反應：偶有皮膚疹，極少發生搔癢、藥物熱。

4. 心臟血管：極少數偶有心悸亢進、熱潮紅、偏頭痛、昏博。

5. 其他：極少數偶有關節痛、全身虛弱感、輕微光過敏、暫時性腎功能減弱。耳鳴、暫時性聽力減弱的症狀很少發生。

6. 血液學方面：偶有 eosinophilia, leucocytopenia, leucocytosis, 貧血，極少會發生血小板減少、增多以及凝血酵素原值改變的情形。

7. 醫檢值/尿沈澱：特別是肝功能不良之病人，偶會發生 transaminases 及 alkaline phosphatase 值升高，或膽汁鬱滯性黃疸；血中尿酸、肌氨酸、膽紅素等值會升高。

注意事項：

1. 含氫氧化鋁或氫氧化鎂之制酸劑會減弱本劑之吸收，因此本劑應於使用此類制酸劑之前 1~2 小時，或使用後 4 小時服用。不含氫氧化鋁或氫氧化鎂之制酸劑不在此限(例如：H₂接受體封阻劑)。

2. 本劑若與 theophylline 合用，則 theophylline 血中濃度會升高，因此會產生由 theophylline 所引起之副作用。若無法避免合用，應測定 theophylline 血中濃度值，並依此來減少劑量。

3. 動物實驗顯示高劑量的 quinolones(gyrase 抑制劑)與非固醇類的抗消炎藥物合用，會導致痙攣。然而，此交互作用尚未於使用本劑的病人中發現。

4. 本劑與 cyclosporin 合用，血中肌氨酸值會暫時升高，因此這類病人要每週 2 次監視其血中肌氨酸濃度。

5. 本劑會影響駕車或操縱機械的反應能力。酒精會加強此效應。

6. 應置於小孩取不到之處。

7. 副作用報告顯示 FLOROQUINOLONE 類抗菌劑可導致肌腱炎或肌腱斷裂，若有肌腱疼痛、發炎、斷裂之情形，應立即停藥。

貯存：避光室溫貯存。

包裝：4~1000 粒塑膠瓶、鋁箔盒裝。

**中國化學製藥股份有限公司**

CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.

總公司：台北市襄陽路 23 號 TEL：(02)23124200

新豐工廠：新竹縣新豐鄉坑子口 182-1 號

®