

動物用/注射劑

動物藥製字第 0182 號

嘉徽素-100 注射液

Kanamycin-100 Injection Vet. Use

網號：Y38

Kanamycin Sulfate 為一廣效性抗生素，已由醫藥界所公認對人類與禽畜細菌性疾患具有強力之治療效果，本公司動物用藥品嘉徽素注射劑(粉劑)問世以來，迭獲獸醫，畜牧業者好評，茲進一步研究製造，提出 Kanamycin Sulfate 水溶液注射劑，具有藥效安定，使用方便之優點。

成分：每 ml 含有：Kanamycin Sulfate, Sterile.....100mg(力價)。

作用：1.Kanamycin 抗菌範圍廣，對革蘭氏陰、陽性菌及分枝菌屬(肺炎菌、大腸菌、結核菌、葡萄球菌、鏈球菌、沙門氏桿菌，布氏桿菌，弧狀菌，變形菌，志賀氏菌，螺旋菌)等之各種細菌呈現強力阻止發育作用。特別對於易引起禽畜慢性呼吸器疾病(C.R.D.)肺炎和萎縮性鼻炎之類似胸膜肺炎(P.P.L.O)細菌，及與大腸桿菌所併發之胸腹膜炎，具有最高藥效。

2.Kanamycin 與日常使用之其他抗生素無交叉耐性之現象，故對於已對其他抗生物質獲有抗藥性之葡萄球菌，大腸菌，痢疾菌，及已對 Streptomycin, PAS, INAH 等獲有抗藥性之結核菌均有感受性。

3.毒性低，對於平衡神經系及聽覺神經系之障害均較 Streptomycin 或 Dihydrostreptomycin 為弱。

4.本劑為水溶液，藥效安定，吸收迅速，作肌肉注射一小時後呈現最高之血中濃度，分布於各臟器，24 小時後主要通過腎臟，由尿中排泄。

適應症：急性慢性呼吸器疾患、生殖泌尿道感染症、消化道感染症、一般化膿性疾病。

說明：

家畜：1.結核症：肺結核，泌尿器結核，性器結核，淋巴腺結核。 2.呼吸道感染症：肺炎，肺疫，支氣管炎，咽喉炎，扁桃腺炎，萎縮性鼻炎，流行感冒，百日咳。 3.生殖泌尿道感染症：急性腎盂腎炎，膀胱炎，尿道炎，副睪丸炎，子宮內膜炎，子宮頸管炎。 4.消化道感染症：細菌性下痢，腸炎，腸出血，惡性痢疾，弓蟲病，肝炎，膽囊炎。 5.一般化膿性疾患：由葡萄球菌，鏈球菌，肺炎球菌或綠膿菌引起之膿瘍疹，蜂窩織炎，淋巴節炎，膿瘍，乳房炎，乳腺炎，中耳炎，骨髓炎，癰，疔，癰。 6.其他：豬丹毒，螺旋體感染症，狗瘟熱二次感染，關節炎，手術前後之感染預防。

家禽：急性慢性呼吸器疾患，傳染性可利查，魯布，支氣管炎，肺囊症，喉頭炎，滑膜炎，竇炎，細菌性下痢，赤痢，白痢。

用法：每次劑量：

1.牛、馬：	50kg 以下	50~300mg	2.豬：	10kg 以下	50~150mg
	50~200 kg	300~1,000mg		10~30kg	150~300mg
	200~500 kg	1,000~2,500mg		30~60kg	300~600mg
	500 kg 以上	2,500~5,000mg		60kg 以上	600~1,000mg
3.山羊，綿羊：	5kg 以下	50~200mg	4.狗、貓、兔：	3kg 以下	20~50mg
	5~10kg	200~500mg		3~10kg	50~200mg
	10~50kg	500~1,000mg		10~20kg	200~400mg
5.家禽：	1kg 以下	15~25mg	或按體重每公斤 10~30mg，每日一次施肌肉或皮下注射，可按症狀輕重增減劑量。		
	1~2kg	25~50mg			
	2kg 以上	50~100mg			

注意事項：1.連續使用時，注射部位應變更之。 2.本劑為無色或淡黃色澄清液，色調有時雖多少有增加，但力價並無減低，可安心使用。 3.使用天數 3~5 天。 4.停藥期：30 天。

5.本處方藥品限由執業獸醫師(佐)監督之下使用。

包裝：20mlX10,50,100Vials,
50mlX10Vials, 100mlX10Vials。



中國化學製藥股份有限公司

CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.

總公司：台北市襄陽路 23 號 TEL：(02)23124200

新豐工廠：新竹縣新豐鄉坑子口 182-1 號 e