

■ 中化製藥動藥處 製品目錄
2020 PRODUCT CATALOG



CCPC

中國化學製藥股份有限公司動物用產品事業處

用熱誠的心·為動物鋪上健康之路

Drugs for Pigs and Cattle

牛、豬用藥品

安蒙西林－150懸濁注射液	Amoxicillin-150	Injection	1
安西林鈉乾粉注射劑	Ancillina	Injection	1
配尼濁懸濁注射液	Penisol	Injection	2
配尼黴素－S 懸濁注射液	Penimycin-S	Injection	2
讚配尼“長效”懸濁注射液	Paurain LA	Injection	3
賜福咳寧乾粉注射劑	Ceftiofur Sodium	Injection	3
賜福肺清滅菌懸劑	Ceftiofur Hcl	Injection	4
賜福晶靈滅菌懸劑	Ceftiofur CFA	Injection	4
賜福克寧注射劑	Cekunome	Injection	5
久強寧“長效”注射劑	Chanacycline L.A.	Injection	5
林可黴素－300注射劑	Lincomycin-300	Injection	6
可賜興-150注射劑	Cotusin-150	Injection	6
益樂富10%注射劑	Enroxacin 10%	Injection	7
獲利欣－300注射劑	Floricin-300	Injection	7
獲利欣10%	Floricin 10%	Solution	8
全達口服液	Gentacin	Oral Sol.	8
嘉黴素－100注射液	Kanamycin-100	Injection	9
嘉黴素－250注射液	Kanamycin-250	Injection	9
泰樂新注射液	Tylosin	Injection	10
泰樂新20%注射劑	Tylosin 20%	Injection	10
萬靈素軟膏劑	Oxineomycin	Ointment	11
新萬靈素軟膏劑	Tetraneomycin	Ointment	11
舒美淨33½%注射液	Sumezin 33½%	Injection	12
泰利美寧注射劑	Trimerin	Injection	12
泰利美寧48%口服懸液劑	Trimerin 48%	Oral Susp.	13
嘔滅諾 5%	Flumeizole 5%	Powder	14

Drugs for Pigs and Cattle

牛、豬用藥品

嘑滅諾 5%	Flumeizole 5%	Powder	14
易滅蟲注射劑	Ivermectin	Injection	15
易滅蟲澆滴劑 0.5%	Ivermectin pour-on 0.5%	Solution	15
易滅蟲0.6%散劑	Ivermectin 0.6%	Powder	16
樂蟲滅散	Lepicom	Powder	16
特球除5%	Toltracox 5%	Oral Susp.	17
舒爾必寧50%注射液	Sulpyrin 50%	Injection	18
新感冒靈-S注射液	Neo-Coldenin S	Injection	18
力克爽注射液	Dexamethasone	Injection	19
賜鎮注射劑	Stin	Injection	19
特威鎮注射劑	Tolvetin	Injection	20
福力鎮 5%長效注射劑	Fluliten	Injection	20
安期B-25消毒劑	Anti B-25	Solution	21
百潔碘-30消毒劑	Biodyne-30	Solution	21
碘浴寶消毒液	Iodiper	Solution	22
碘浴寶消毒液	Iodiper	Solution	22
美極命-G注射液	Methimin-G	Injection	23
維畜鈣注射液	Polycalcium	Injection	23
複方維他命B注射液	Vitalex	Injection	24
通血能200注射劑	Tonkey 200	Injection	24
鈣立飲長效口服液劑	Cow Glucon LA Oral Sol.	Solution	25
鈣立飲長效口服液劑	Cow Glucon LA Oral Sol.	Solution	25
鈣立飲散劑	Cow Glucon Powder	Powder	26
鈣立飲粒料	Cow Glucon Pellet	Pellet	26
催產素注射劑	Oxytocin	Injection	27
催產素注射劑	Oxytocin	Injection	27

Drugs for Pigs and Cattle

牛、豬用藥品

畜舒坦	Stroless	Injection	28
安蒙西林20%	Amoxicillin W.S.P 20%	W.S.Powder	29
安蒙西林20%	Amoxicillin W.S.P 20%	W.S.Powder	29
安蒙西林50%	Amoxicillin W.S.P 50%	W.S.Powder	30
安蒙西林50%	Amoxicillin W.S.P 50%	W.S.Powder	30
賜福素散	Cephalin	W.S.Powder	31
賜福素散	Cephalin	W.S.Powder	31
可立使淨－110	Colistin-110	Powder	32
林可黴素－110	Lincomycin-110	Powder	32
林可黴素－220	Lincomycin-220	Powder	33
林可黴素 40%	Lincomycin 40%	W.S.Powder	33
可賜興－666	Cotusin-666	W.S.Powder	34
多欣－200	Doxin-200	W.S.Powder	34
肥力王－VN	Feradox-VN	W.S.Powder	35
獲利欣 1%	Floricin 1%	Powder	35
獲利欣10%	Floricin 10%	Powder	36
經四環素－220	Oxytetracycline-220	Powder	36
經四環素－500	Oxytetracycline-500	W.S.Powder	37
氯多欣散劑	Chlordoxin 15.4% Powder	Powder	37
泰康欣－200	Tiacosin-200	Powder	38
泰康欣 250	Tiacosin 250	Solution	38
泰樂新AT-50散劑	Tylosin AT-50	Powder	39
泰利美寧	Trimerin	Powder	39
中化泰妙素 20%	C.C.P.C. Tiamulin 20%	Powder	40
中化泰妙素 20%	C.C.P.C. Tiamulin 20%	Powder	40
泰黴素－220	Tylosin-220	Powder	41

Drugs for Pigs and Cattle

牛、豬用藥品

克嗽靈	Cousorin	Powder	42
克嗽靈	Cousorin	Powder	42
長生精精液稀釋劑	Semengra Semen Extender	Powder	43
速保精II 精液稀釋液	Sperm-up II	Solution	43
賜滅痢注射液	Smelin	Injection	44

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

抗菌劑

Antimicrobial agent

<p>產 品</p>		
<p>製品 編號</p>	<p>E000853</p>	<p>E000115</p>
<p>品 名</p>	<p>安蒙西林－150懸濁注射液[®] Amoxicillin-150[®] Injection 100mL/10vial</p>	<p>安西林鈉乾粉注射劑[®] Ancillina[®] Injection 12.5gm/10vial</p>
<p>成 份</p>	<p>Each mL contains : Amoxicillin Trihydrate....150mg(potency)</p>	<p>Each vial contains : Ampicillin Sodium....12.5gm(potency)</p>
<p>說 明</p>	<p>適應症 治療由革蘭氏陽性、陰性菌感染所引起之放線菌病、惡性水腫、沙氏桿菌症、氣腫疽、豬丹毒、出血性敗血症、大腸桿菌症及一般化膿症。</p> <p>用法用量 以皮下或肌肉注射方式投予動物，使用前必須充份搖晃瓶子，使懸浮液均勻。一般建議量為每天一次，每公斤體重7mg(力價)，或每5公斤體重注射0.25mL，連續治療3~5天。 ※停藥期：10天，乳汁：24小時。</p>	<p>適應症 治療家禽畜由鏈球菌、葡萄球菌、肺炎雙球菌、大腸桿菌、變形菌等引起之感染症。</p> <p>用法用量 以注射用水溶解後行肌肉注射。 1. 家畜：按體重每公斤每日注射10~20mg，2~3天，嗜血桿菌症30mg。視動物種類、體重、症狀，增減劑量。 2. 家禽：按體重每公斤每日注射10~20mg 2~3天。 ※停藥期：5天，乳汁：72小時。</p>
<p>處方 藥別</p>	<p>第二類</p>	<p>第二類</p>

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

抗菌劑

Antimicrobial agent

<p>產 品</p>		
<p>製品 編號</p>	<p>E002336</p>	<p>E002123</p>
<p>品 名</p>	<p>配尼濁懸濁注射液[®] Penisol[®] Injection 100mL/10vial</p>	<p>配尼黴素-S 懸濁注射液[®] Penimycin-S[®] Injection 100mL/10vial</p>
<p>成 份</p>	<p>Each mL contains : Procaine Penicillin G....300,000 I.U</p>	<p>Each 2mL contains : Procaine Penicillin G....400,000 I.U. Dihydrostreptomycin Sulfate....0.5gm(potency)</p>
<p>說 明</p>	<p>適應症 革蘭氏陽性菌、葡萄球菌、鏈球菌、肺炎球菌、淋菌、髓膜炎菌、瓦斯壞疽菌、放線菌、炭疽菌引起之各種疾患。外傷、火傷感染、手術前後之感染。</p> <p>用法用量 按體重每公斤注射 4,000 ~ 8,000 I.U. (0.013~ 0.027mL) , 依症狀增減, 每日一次施行肌肉深部注射, 連續治療3~5天。 乳房炎治療: 牛: 每一乳房每次注入300,000~1,000,000 I.U.每日施用一次, 依症狀增減劑量。羊: 劑量按牛減半施用。 本劑灌注乳房後48小時內, 牛羊奶不可飲用。 ※停藥期: 14天。</p>	<p>適應症 各型革蘭氏陽性菌與陰性菌混合感染症、肺炎、肺疫、腸炎、下痢、丹毒、化膿症、乳房炎、中耳炎、子宮內膜炎、心內膜炎、關節炎、產褥熱、運輸熱、火傷、腺疫、尿道感染症、破傷風、犬瘟熱二次感染症、家兔梅毒、炭疽菌症、放線菌症、螺旋鈎端體症及其他各種炎症。</p> <p>用法用量 家畜: 牛、馬 10~30mL。大豬 4~10mL。中豬 2~4mL。小豬 1~2mL或每公斤0.02~0.04mL計算。 家禽: 0.05~0.5mL/隻。 依體重症狀增減行肌肉注射, 連續治療2~3天。 ※停藥期: 14天。</p>
<p>處方 藥別</p>	<p>第二類</p>	<p>第二類</p>

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

抗菌劑

Antimicrobial agent

<p>產 品</p>		
<p>製品 編號</p>	<p>E001342</p>	<p>P614367-60</p>
<p>品 名</p>	<p>讚配尼“長效”懸濁注射液[®] Paurain LA[®] Injection 100mL/10vial</p>	<p>賜福咳寧乾粉注射劑[®] Ceftiofur Sodium[®] Injection 4gm/10vial</p>
<p>成 份</p>	<p>Each mL contains : Benzathine Penicillin G....100,000 I.U. Procaine Penicillin G....100,000 I.U. Dihydrostreptomycin Sulfate....200mg (potency)</p>	<p>Each vial contains : Ceftiofur Sodium.....4gm (pot.)</p>
<p>說 明</p>	<p>適應症 豬、牛、馬：治療細菌性肺炎、豬丹毒、敗血症、子宮炎、乳房炎、母豬無乳症候群 (MMA)。</p> <p>用法用量 豬、馬及牛：每100kg體重，每三天肌肉注射5~10mL。 仔豬、仔馬、仔牛及小動物：每25公斤體重，每三天肌肉注射1~ 2mL。 ※停藥期：肉用：10 天，乳用：擠乳10次。</p>	<p>適應症 豬：治療由胸膜肺炎放線桿菌、溶血性巴斯德桿菌、豬霍亂沙氏桿菌和豬鏈球菌二型等廣泛的 G(+) 及 G(-)敏感性細菌所引起的豬隻呼吸道疾病。牛：治療牛呼吸道疾病(運輸熱及細菌性肺炎)、溶血性巴斯德桿菌、血性巴斯德桿菌和嗜血桿菌 的混合感染症。</p> <p>用法用量 豬：以注射用蒸餾水100mL稀釋，標準劑量為每日每公斤體重 2mg，連續使用 1 至 3 天。 牛：以注射用蒸餾水80mL稀釋，標準劑量為每日每公斤體重 1mg，作一次深部肌肉注射，每天 1 次，連續使用 3 天至 5 天。 ※停藥期: 牛 5 天，豬 3 天。</p>
<p>處方 藥別</p>	<p>第二類</p>	<p>第二類</p>

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

抗菌劑

Antimicrobial agent

<p>產 品</p>		
<p>製 品 編 號</p>	<p>P614374-60</p>	<p>P614381-60</p>
<p>品 名</p>	<p>賜福肺清滅菌懸劑[®] Ceftiofur Hcl[®] Injection 100ml/10vial</p>	<p>賜福晶靈滅菌懸劑[®] Ceftiofur CFA[®] Injection 100mL/vial</p>
<p>成 份</p>	<p>Each mL contains : Ceftiofur (hydrochloride).....50mg</p>	<p>Each mL contains : Ceftiofur (Crystalline Free Acid Micronized)100mg(Pot.)</p>
<p>說 明</p>	<p>適應症 豬隻及成年牛隻:治療由胸膜肺炎放線桿菌、巴斯德桿菌和嗜血桿菌引起之呼吸道疾病，由壞死性梭菌及黑色素生成菌引起之蹄真皮炎、子宮炎及對 Ceftiofur 具感受性細菌引起之感染。</p> <p>用法用量 豬隻：每 50 公斤體重肌肉注射 1-3mL，每 24 小時注射一次，連續 3 天。牛隻：每 50 公斤體重肌肉或皮下注射 1-2mL，每 24 小時注射一次，連續 3-5 天。 ※停藥期: 肉豬 48 小時；肉用牛：48 小時；牛乳 0 天。</p>	<p>適應症 豬：治療因胸膜肺炎放線桿菌、敗血性巴氏桿菌、副豬嗜血菌及豬鏈球菌引起的呼吸道疾病。</p> <p>用法用量 以肌肉注射本劑於豬隻耳後頸處。每公斤體重投予單一劑量 5mg 的 Ceftiofur，相當於每 20 公斤體重使用 1mL 本劑。同一注射部位不可注射超過 2mL 本劑，以免造成殘留。40 公斤以上之豬隻 則需分成二次以上注射。大部份動物於投藥後 3-5 天即產生療效。若未見改善，則應重新診斷。 ※停藥期:18天。</p>
<p>處 方 藥 別</p>	<p>第二類</p>	<p>第二類</p>

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

抗菌劑

Antimicrobial agent

<p>產 品</p>		
<p>製 品 編 號</p>	<p>E612065-60</p>	<p>N002586-60</p>
<p>品 名</p>	<p>賜福克寧注射劑[®] Cekunome[®] Injection 100mL/vial</p>	<p>久強寧“長效”注射劑[®] Chanacycline L.A.[®] Injection 100mL/10vial</p>
<p>成 份</p>	<p>Each mL contains : Cefquinome(sulfate)...25mg</p>	<p>Each mL contains : Oxytetracycline Dihydrate BP....200mg (potency)</p>
<p>說 明</p>	<p>適應症 作為牛隻與豬隻細菌感染之治療藥劑，可有效控制對cefquinome具感受性之革蘭氏陽性及陰性菌感染。</p> <p>用法用量 牛:呼吸道感染、腐蹄病、蹄葉炎。具全身性症狀之大腸桿菌性乳房炎。2mL/50kg BW，IM，連續治療3~5天。 犏牛:大腸桿菌性敗血症，4mL/50kg BW，IM，連續治療3~5天。 豬:呼吸道感染、乳房炎/子宮炎/無乳症(MMA)，2mL/25kg BW，IM，連續治療2~3天。 仔豬:腦膜炎、關節炎、表皮炎，2mL/25kg BW，IM，連續治療5天。 ※停藥期：牛：5天，乳汁：1天。豬：3天。</p>	<p>適應症 牛:放線桿菌症、犢白喉、腐蹄，以及乳房炎、子宮炎、巴斯德桿菌症、肺炎、邊蟲症等之輔助治療。 羊:腐蹄、乳房炎、子宮炎、肚臍及關節炎、肺炎、披衣菌症。 豬:丹毒、乳房炎/子宮炎/無乳症(MMA)、肚臍及關節炎。</p> <p>用法用量 限深部肌肉注射，注射前先用酒精棉清潔注射部位。 建議劑量:每公斤體重20mg或每100公斤體重10mL。同一部位注射最高劑量:牛20mL、綿羊5mL、豬10mL。 ※停藥期:肉用家畜:在最後一次治療後28天，牛乳:在最後一次治療後8天，不得用於乳羊。</p>
<p>處 方 藥 別</p>	<p>第二類</p>	<p>第二類</p>

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

抗菌劑

Antimicrobial agent

<p>產 品</p>		
<p>製 品 編 號</p>	<p>E000509</p>	<p>E000011</p>
<p>品 名</p>	<p>林可黴素-300注射液[®] Lincomycin-300[®] Injection 100mL/10vial</p>	<p>可賜興-150注射劑[®] Cotusin-150[®] Injection 100mL/10vial</p>
<p>成 份</p>	<p>Each mL contains : Lincomycin HCL.....300mg(potency)</p>	<p>Each mL contains : Lincomycin HCL monohydrate..... 50mg (potency) Spectinomycin Sulfate tetrahydrate.....100mg (potency)</p>
<p>說 明</p>	<p>適應症 治療革蘭氏陽性菌及其它具感受性細菌所引起之感染症：如細菌性肺炎、氣管炎、CRD、可利查、中耳炎、膿胸、細菌性腦膜炎、蜂窩組織炎、膿瘍、細菌性敗血症、放線菌症。</p> <p>用法用量 按體重每公斤10~20mg之用量每日1~2次，依症狀增減。行肌肉注射或靜脈注射投藥，每日一次。 ※停藥期：7天。</p>	<p>適應症 ◎豬：治療感受性細菌所引起之傳染性關節炎，感受性細菌。◎雞及火雞：治療黴漿菌屬和/或大腸桿菌感染引起之氣囊病，家禽霍亂，雛火雞的阿利桑納(副結腸)感染，以及葡萄球菌感染。◎犬：治療呼吸道感染，皮膚病，尿路感染，以及續發性細菌性感染。</p> <p>用法用量 ◎豬：治療關節炎、腸炎或黴漿菌性肺炎，1mL/10kg BW，IM，連續3~7天。放線桿菌胸膜肺炎，0.2mL/kg BW，連續3天。◎雞及火雞：0.2mL/kg BW，SC，連續3天。◎犬：1mL/5kg BW，IM，每天1~2次。 ※停藥期：21天，雞16週齡以上、產蛋中之蛋雞不得使用。</p>
<p>處 方 藥 別</p>	<p>第二類</p>	<p>第二類</p>

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

抗菌劑

Antimicrobial agent

<p>產 品</p>		
<p>製 品 編 號</p>	<p>E000224</p>	<p>E001713/N001561</p>
<p>品 名</p>	<p>益樂富10%注射劑® Enroxacin 10%® Injection 100mL/10vial</p>	<p>獲利欣-300注射劑® Floricin-300® Injection 100mL/vial/10vial</p>
<p>成 份</p>	<p>Each mL contains : Enrofloxacin.....100mg</p>	<p>Each mL contains : Florfenicol....300mg</p>
<p>說 明</p>	<p>適應症 治療牛、豬因革蘭陰性菌、革蘭陽性菌及黴漿菌等所引起之感染症。牛：由細菌感染所引起的呼吸器官及消化道疾病以及由病毒感染後所引起之二次感染。豬：呼吸道或消化道感染(巴氏桿菌症，黴漿菌症，大腸菌下痢，大腸菌性敗血症，沙門氏菌症)。複雜性疾病如萎縮性鼻炎，地方性肺炎及MMA徵候群等。馬：禁止使用。</p> <p>用法用量 一般對於牛(體重250公斤以上，皮下注射)及豬(肌肉注射)，每100公斤體重注射2.5mL。如果是嚴重的呼吸道感染或沙門氏菌症，劑量可增加至每100公斤注射5mL。 ※停藥期：8天。</p>	<p>適應症 治療對Florfenicol敏感之病菌感染。牛：治療因Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida, Haemophilus somnus引起的呼吸道感染。豬：治療因Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae引起的呼吸道感染。</p> <p>用法用量 牛：1mL/15kg BW，IM，注射2劑，間隔48小時。2mL/15kg BW，SC，使用16號針頭注射一劑。每一注射部位的注射劑量不得超過10mL。 豬：1mL/20kg BW，IM，注射2劑，間隔48小時。 ※停藥期：牛：肉用牛：肌肉注射30天，皮下注射44天。乳牛：泌乳期間禁止使用。豬：肉用：14天。</p>
<p>處 方 藥 別</p>	<p>第二類</p>	<p>第二類</p>

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

抗菌劑

Antimicrobial agent

產品		
製品編號	E001706/E001490	E031156
品名	<p>獲利欣10%® Floricin 10%® Solution</p> <p>500mL/1000mL</p>	<p>全達口服液® Gentacin® Oral Sol.</p> <p>160mL/10Btl</p>
成份	<p>Each mL contains : Florfenicol....100mg</p>	<p>Each mL contains : Gentamicin Sulfate....6.25mg(potency)</p>
說明	<p>適應症 治療豬放線桿菌胸膜肺炎及雞大腸桿菌症。</p> <p>用法用量 豬:每日每公斤體重投與本品0.01mL~0.02mL相當於Florfenicol 1~2 mg(即本品0.01mL~0.02mL)之量,加入飲水混合後經口投與。雞每日飲水的1/4至1/2中,以每公斤體重投與本品0.2mL(相當於Florfenicol 20mg),加入飲水混合後經口投與,連續使用五天。 ※停藥期:豬:3天,雞:5天,土番鴨:14天,雞16週齡以上,產蛋中之蛋雞不得使用。</p>	<p>適應症 治療1~3日齡出生小豬之大腸桿菌症,感染性下痢。</p> <p>用法用量 將Pump的白色塑膠管開口置於小豬的舌根,用力壓縮Pump一次(每壓縮一次約0.8ml,相當於Gentamycin 5mg的力價),通常小豬只須服用1次劑量,即可見效。 ※停藥期:屠宰食用乳豬,須停用本劑至少14天後行之。</p>
處方藥別	第三類	第三類

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

抗菌劑

Antimicrobial agent

產品		
製品編號	E001294	N001224
品名	嘉黴素-100注射液® Kanamycin-100® Injection 100mL/10vial	嘉黴素-250注射液® Kanamycin-250® Injection 100mL/10vial
成份	Each mL contains : Kanamycin Sulfate....100mg(potency)	Each mL contains : Kanamycin Sulfate....250mg(potency)
說明	<p>適應症 急慢性呼吸器疾患、生殖泌尿道感染症、消化道感染症、一般化膿性疾病。</p> <p>用法用量 按體重每公斤10~30mg，每日一次行肌肉注射或皮下注射，可按症狀輕重增減劑量。 ※停藥期：30天。</p>	<p>適應症 治療家畜： 1.呼吸道感染症-肺炎(肺疫)、支氣管炎。2.生殖泌尿道感染症-子宮內膜炎。3.消化道感染症-細菌性下痢(腸炎)。4.一般化膿性疾患-由葡萄球菌、鏈球菌、肺炎球菌或綠膿菌引起之膿痂疹、蜂窩織炎、淋巴結炎、膿瘍、乳房炎、中耳炎、骨髓炎。5.其他-豬丹毒、犬瘟熱二次感染、關節炎、手術前後之感染。</p> <p>用法用量 1.牛、馬、山羊、綿羊：(每公斤體重:0.02~0.04mL)。 2.豬、狗、貓、兔、家禽：(每公斤體重:0.04~0.08mL)。 每日一次施行肌肉或皮下注射，可連續用2~3天。</p>
處方藥別	第二類	第二類

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

抗菌劑

Antimicrobial agent

<p>產 品</p>		
<p>製 品 編 號</p>	<p>E003746</p>	<p>N001145</p>
<p>品 名</p>	<p>泰樂新注射液[®] Tylosin[®] Injection 100mL/10vial</p>	<p>泰樂新20%注射劑[®] Tylosin 20%[®] Injection 100mL/10vial</p>
<p>成 份</p>	<p>Each mL contains : Tylosin Tartrate.....50mg (potency)</p>	<p>Each mL contains: Tylosin.....200mg(potency)</p>
<p>說 明</p>	<p>適應症 對禽畜革蘭氏陽性、陰性，類胸膜炎細菌(P.P.L.O.)引起之疾患均具藥效。家禽之慢性呼吸道疾病、支氣管炎、喉炎、肺炎、細菌性感染症。家畜之肺炎、白喉、子宮炎、腐蹄症、豬丹毒、細菌性下痢及手術或創傷後併發感染症。</p> <p>用法用量 牛：每50kg體重2~4mL 豬：每50kg體重2~8mL 初生豬：每kg注射0.2~0.5mL 家禽：每kg注射0.2~0.5mL 每日一次，按體重症狀增減肌肉注射。 ※停藥期：牛：8天，豬：4天，肉雞：3天，火雞：5天，乳汁：96小時。</p>	<p>適應症 牛、綿羊、山羊、豬、狗：呼吸道疾病。 豬：壞死性腸炎、紅斑、地方性支氣管炎、赤痢。 綿羊、山羊：乳房炎、子宮內膜炎、傳染性無乳症。 母牛、綿羊：初期黴漿菌關節炎、弧菌病。 小牛、母牛：指頭膿炎、耳炎、傳染性傷口、鈎端螺旋體症、傳染性結膜炎。</p> <p>用法用量 肌肉注射，一處勿施打超過10mL，每天1次，連續3~5天。 牛：每100公斤體重使用2~5mL。小牛：每50公斤體重使用2.5mL。綿羊、山羊：每50公斤體重使用3mL。豬、狗：每50公斤體重使用2.5mL。 ※停藥期：食用肉、乳品：5天。</p>
<p>處 方 藥 別</p>	<p>第二類</p>	<p>第二類</p>

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

乳房炎軟膏劑

Ointment for Mastitis

產品		
製品編號	E001483	E001469
品名	萬靈素軟膏劑 [®] Oxineomycin [®] Ointment 7.5gm/60's	新萬靈素軟膏劑 [®] Tetraneomycin [®] Ointment 8.0gm/60's
成份	Each syringe contains : Oxytetracycline HCL....200mg (potency) Neomycin Sulfate....25mg (potency) Sulfathiazole....150mg Hydrocortisone Acetate....20mg	Each syringe (8gm) contains : Tetracycline Hydrochloride....200mg(Potency) Neomycin Sulfate....250mg(potency) Bacitracin....2000I.U.(potency) Prednisolone....10mg
說明	<p>適應症 治療因葡萄球菌、鏈球菌及其它感染性細菌引起之乳房炎。</p> <p>用法用量</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.對鏈球菌引起之無乳性乳房炎：每一乳房每次注入1支。 2.對葡萄球菌性乳房炎：每一乳房每次注入1支，每隔48小時連續施用，直到乳房及乳液恢復正常。 3.對其他感染性細菌所引起之乳房炎：每一乳房每次注入1支，每隔24小時，連續施用直到乳房及乳液恢復正常。 <p>※停藥期：最後一次注入後72小時內的牛乳不可供人飲用。</p>	<p>適應症 乳房炎之治療，包括由大腸桿菌、葡萄球菌所引起之乳房炎。</p> <p>用法用量</p> <p>在擠完乳汁後，並清洗乳頭後，立即於感染乳房內注入1支本劑，如有必要可於24小時後重覆治療1次。</p> <p>※停藥期：最後一次注入後72小時內的牛乳不可供人飲用。</p>
處方藥別	第三類	第三類

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

磺胺劑

Sulfonamides

<p>產 品</p>		
<p>製 品 編 號</p>	<p>E043025</p>	<p>E043362</p>
<p>品 名</p>	<p>舒美淨33 1/3%注射液® Sumezin 33 1/3%® Injection 100mL/10vial</p>	<p>泰利美寧注射劑® Trimerin® Injection 100mL/10vial</p>
<p>成 份</p>	<p>Each 100mL contains : Sulfamethazine Sodium....33.3gm</p>	<p>Each mL contains : Trimethoprim....40mg Sulfadiazine....200mg</p>
<p>說 明</p>	<p>適應症 早發性大腸桿菌、球蟲症、流行性感冒、產褥熱、子宮內膜炎、陰道炎等各種細菌感染症。</p> <p>用法用量 牛、馬：20~40 mL。 豬、羊：5~20 mL。 犬、貓：2~5 mL。 或按體重初劑量每公斤0.3~0.6 mL，維持劑量減半。 每日一次，施行靜脈、肌肉或腹膜注射；但羊及綿羊則每日注射二次。 ※停藥期：10天，乳汁：96小時。</p>	<p>適應症 具廣泛之抗菌效果及療效。 呼吸系統：肺炎、氣管炎、支氣管炎。消化疾病：細菌性白痢、胃腸炎。泌尿生殖疾病：子宮炎、陰道炎、產褥熱、腎炎、膀胱炎等。原蟲疾病：弓蟲症。一般感染：敗血症、細菌性泌乳缺乏症、創傷感染、手術及生產後細菌感染。</p> <p>用法用量 一般動物行肌肉注射(請勿靜脈注射)，按體重每公斤注射0.06~0.1 mL，每日一次；視病症酌情增減劑量，必要時可於24~48小時後重複注射。 ※停藥期：10天。</p>
<p>處 方 藥 別</p>	<p>第二類</p>	<p>第二類</p>

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

磺胺劑

Sulfonamides

產品	
製品編號	E041418
品名	泰利美寧48%口服懸液劑 [®] Trimerin 48% [®] Oral Susp. 500mL/Btl
成份	Each mL contains : Sulfadiazine....400mg Trimethoprim....80mg
說明	<p>適應症</p> <p>雞：治療具感受性之細菌感染症：如大腸桿菌症、沙氏桿菌症、巴斯德桿菌症、傳染性可利查及其它二次性細菌感染。</p> <p>豬：治療具感受性之細菌感染症：如大腸桿菌症、沙氏桿菌症、巴斯德桿菌症。</p> <p>用法用量</p> <p>雞：每2.5公升飲水加入本劑1毫升或在500公升之飲水槽中加入本劑200mL。</p> <p>豬：每2公升飲水加入本劑1毫升或在400公升之飲水槽中加入本劑200mL。連續投藥5天或使用至症狀消失2天後，勿超過14天。</p> <p>※停藥期：5天。</p>
處方藥別	第三類

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

驅蟲劑

Anthelmintics

<p>產 品</p>		
<p>製品 編號</p>	<p>N151330</p>	<p>N151323</p>
<p>品 名</p>	<p>嘑滅諾 5%[®] Flumeizole 5%[®] Powder 600gm/Bag</p>	<p>嘑滅諾 5%[®] Flumeizole 5%[®] Powder 25kg/Bag</p>
<p>成 份</p>	<p>Each gm contains : Flubendazole....50 mg</p>	<p>Each gm contains : Flubendazole....50 mg</p>
<p>說 明</p>	<p>適應症 豬：肺蟲、腸結節蟲、紅色胃蟲、籃松桿蟲、鞭蟲、腎蟲及蛔蟲。 雞：盲腸蟲、蛔蟲、條蟲、毛樣線蟲及開嘴蟲。</p> <p>用法用量 豬：1. 個別驅蟲：5mg(1gm/10kg 體重)一次給予。2. 集體驅蟲：驅除蛔蟲：10ppm(200gm/噸)連續使用2天。驅除所有寄生蟲：30ppm(600gm/噸)連續使用5天。3. 預防肝白斑：4ppm(80gm/噸)使用至屠宰。 雞：1. 驅除蛔蟲：10ppm(200gm/噸) 連續使用7天。2. 驅除盲腸蟲：30ppm(600gm/噸) 連續使用7天。3. 驅除毛樣線蟲：20ppm(400gm/噸) 連續使用7天。 ※停藥期：豬：14天，雞：5天。</p>	<p>適應症 豬：肺蟲、腸結節蟲、紅色胃蟲、籃松桿蟲、鞭蟲、腎蟲及蛔蟲。 雞：盲腸蟲、蛔蟲、條蟲、毛樣線蟲及開嘴蟲。</p> <p>用法用量 豬：1. 個別驅蟲：5mg(1gm/10kg 體重)一次給予。2. 集體驅蟲：驅除蛔蟲：10ppm(200gm/噸)連續使用2天。驅除所有寄生蟲：30ppm(600gm/噸)連續使用5天。3. 預防肝白斑：4ppm(80gm/噸)使用至屠宰。 雞：1. 驅除蛔蟲：10ppm(200gm/噸) 連續使用7天。2. 驅除盲腸蟲：30ppm(600gm/噸) 連續使用7天。3. 驅除毛樣線蟲：20ppm(400gm/噸) 連續使用7天。 ※停藥期：豬：14天，雞：5天。</p>
<p>處方 藥別</p>	<p>第三類</p>	<p>第三類</p>

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

驅蟲劑

Anthelmintics

<p>產 品</p>		
<p>製 品 編 號</p>	<p>E150574</p>	<p>N151165/N152166</p>
<p>品 名</p>	<p>易滅蟲注射劑[®] Ivermectin[®] Injection 100mL/1vial</p>	<p>易滅蟲澆滴劑 0.5%[®] Ivermectin pour-on 0.5%[®] Solution 500mL/1000mL</p>
<p>成 份</p>	<p>Each mL contains : Ivermectin....10mg</p>	<p>Each mL contains : Ivermectin.....5mg</p>
<p>說 明</p>	<p>適應症 控制及治療豬之內、外寄生蟲。</p> <p>用法用量 豬以頸部皮下注射行之，按體重每33公斤注射1mL。</p> <p>建議治療計畫: 1.種豬：如欲開始進行寄生蟲防治計畫，需將場內所有豬隻全部治療，然後再依下列計畫進行： 母豬：分娩前7 至14 天間予以注射，可減少感染仔豬之危險。 女豬：配種前7 至14 天間予以注射；分娩前7 至14 天間予以注射。 公豬：視其場內污染程度而定；每年至少注射兩次。 ※停藥期：28天。</p>	<p>適應症 牛：治療和控制內寄生蟲和外寄生蟲。</p> <p>用法用量 本產品每mL含有5mg的Ivermectin，每公斤體重建議使用500µg的Ivermectin之劑量，溶液必須沿著牛隻背部從肩胛骨間隆起的部份澆滴到尾部。 推薦劑量：每10公斤體重使用1mL。</p>
<p>處 方 藥 別</p>	<p>第二類</p>	<p>第三類</p>

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

驅蟲劑

Anthelmintics

產品		
製品編號	N150700	N151000
品名	<p>易滅蟲0.6%散劑® Ivermectin 0.6%® Powder</p> <p style="text-align: right;">333gm/Bag</p>	<p>樂蟲滅散® Lepicom® Powder</p> <p style="text-align: right;">1kg/Bag</p>
成份	<p>Each gm contains :</p> <p>Ivermectin.....6mg</p>	<p>Each gm contains :</p> <p>Levamisole HCL eq. to Levamisole Base....100mg</p>
說明	<p>適應症</p> <p>豬隻控制及治療內、外寄生蟲，其作用範圍如下：</p> <p>一、外寄生蟲: 1. 豬穿孔疥癬蟲。2. 吸血性豬蟲。</p> <p>二、內寄生蟲: 1. 豬肺蟲的成蟲。2. 豬腎蟲第四期的幼蟲及成蟲。3. 豬胃、腸內圓蟲: (1) 豬蛔蟲: 成蟲及第四期幼蟲。(2) 紅色毛樣線蟲: 成蟲及第四期幼蟲。(3) 藍松氏豬桿線蟲: 成蟲。</p> <p>用法用量</p> <p>40公斤以下之仔豬及肉豬: 每噸飼料添加本劑一包(333gm)，連續餵食7天。</p> <p>40公斤以上至100公斤以下: 每噸飼料添加本劑400gm，連續餵食7天。</p> <p>※停藥期: 14天。</p>	<p>適應症</p> <p>豬: 蛔蟲及其移行性幼蟲，肺蟲、鞭蟲、腸類圓蟲(淡紅豬圓蟲及結節線圓蟲屬)、類腸圓蟲(藍森桿蟲)。</p> <p>牛、羊: 肺蟲、捻轉線蟲、毛樣線蟲、奧斯達胃蟲、結節線圓蟲、枯貝氏蟲、線蟲。</p> <p>家禽: 蛔蟲、雞盲腸蟲、毛細線蟲。</p> <p>用法用量</p> <p>豬: 依下列用量溶於飲水中，體重100公斤以下，每20公斤體重給予1公克，體重100公斤以上，每頭給予5公克。</p> <p>牛: 每200公斤體重給予10公克溶於水中灌服。</p> <p>家禽: 每公斤體重給0.2~0.25公克溶於飲水中。</p> <p>※停藥期: 7天，乳品: 72小時。</p>
處方藥別	第三類	第三類

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

驅蟲劑

Anthelmintics

產品	
製品編號	N201178
品名	特球除5% [®] Toltracox 5% [®] Oral Susp. 160 mL/10 Btl
成份	Each mL contains : Toltrazuril.....50.0mg
說明	<p>適應症</p> <p>Toltrazuril對球蟲在無性生殖期及有性生殖之各階段均具殺滅效果。對球蟲具全期殺滅效果正是本劑獨特的作用模式。</p> <p>主治效能</p> <p>豬:對於預防經常發生豬球蟲(<i>Isospora suis</i>)所引起球蟲病的豬場，可預防其新生仔豬球蟲病臨床病狀的發生。</p> <p>用法用量</p> <p>本品之治療須單獨投予每隻動物體。</p> <p>每隻3~5日齡之仔豬口服投予一劑，劑量為每公斤體重20mg Toltrazuril(相當於每公斤體重使用0.4mL Toltracox 5%)。若於球蟲症爆發時再使用本藥劑治療，則有可能因動物的小腸已發生病變而效果不彰。</p> <p>※停藥期：豬(仔豬)可食用組織：上市前77天。</p>
處方藥別	第三類

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

解熱鎮痛消炎劑

Antipyretics & Analgesics

<p>產 品</p>		
<p>製 品 編 號</p>	<p>E122951</p>	<p>E111753</p>
<p>品 名</p>	<p>舒爾必寧50%注射液[®] Sulpyrin 50%[®] Injection 100mL/10vial</p>	<p>新感冒靈-S注射液[®] Neo-Coldenin S[®] Injection 100mL/10vial</p>
<p>成 份</p>	<p>Each mL contains : Sulpyrin.....500mg</p>	<p>Each mL contains : Chlorpheniramine Maleate....2.5mg dl-Methyl Ephedrine HCL....20mg Sulpyrin.....150mg</p>
<p>說 明</p>	<p>適應症</p> <p>1.減輕所有動物之腸絞痛、腰肌痛、分娩、由分娩引起之子宮頸口痙攣、癱瘓質斯、神經炎、神經痛，小動物之胃炎，防止嘔吐，炎症及其他一切熱性疾病之鎮痛解熱。</p> <p>2.馬：減輕疼痛、鬆弛腸痙攣、刺激腸蠕動、解除不安及診療時之抵抗、腰痛、強直症(破傷風)。</p> <p>3.牛、馬、豬、山羊、綿羊：異物性食道梗塞症。</p> <p>4.豬：漿膜炎、關節炎。</p> <p>用法用量</p> <p>牛：8mL/100kg BW。馬：20~60 mL。犢、幼獸：5~15 mL。豬：10~30 mL。羊：2~8 mL。犬、貓：1~5 mL。按體重症狀增減，每日1~2次，最好施行靜脈注射或肌肉、靜脈混合注射亦可。</p>	<p>適應症</p> <p>一般感冒、伴有發熱咳嗽之感冒、流行性感冒、肺炎、支氣管炎、咳嗽、氣喘、傷寒及其它疾病引起之發熱疼痛均可使用。</p> <p>用法用量</p> <p>牛、馬：(大)10~25 mL，(小)：5~10 mL 大豬：5~10mL 中豬：2~5mL 小豬：0.5~2mL 羊、犬、貓：1~5mL 雞、火雞(不含蛋雞)：每公斤0.1 mL 按體重症狀每日1~2次，行皮下或肌肉注射。 重症時配合化學治療法製劑使用，效果更佳。</p>
<p>處 方 藥 別</p>	<p>第二類</p>	<p>第一類</p>

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

解熱鎮痛消炎劑

Antipyretics & Analgesics

<p>產 品</p>		
<p>製 品 編 號</p>	<p>E060543</p>	<p>E121565</p>
<p>品 名</p>	<p>力克爽注射液® Dexamethasone® Injection 100mL/10vial</p>	<p>賜鎮注射劑® Stin® Injection 100mL/10vial</p>
<p>成 份</p>	<p>Each mL contains : Dexamethasone Sodium Phosphate eq.to Dexamethasone Phosphate....1mg</p>	<p>Each mL contains : Phenylbutazone....200mg Sodium salicylate....20mg</p>
<p>說 明</p>	<p>適應症 酮症(Ketosis)、產前產後之後肢麻痺、喘息、支氣管炎、肺炎、神經痛、過敏性皮膚炎、犬瘟熱初期炎症之緩解。</p> <p>用法用量 牛：10~30 mL。馬：5~20 mL。 羊：5~10 mL。大豬：5~10mL。 中豬：3~5 mL。小豬：0.5~2 mL。 犬：0.25~2 mL。貓、兔：0.125~0.5mL。 每日一次，施行皮下、肌肉或靜脈注射。 ※停藥期：5天。</p>	<p>適應症 牛、馬、豬：治療傳染性疾病、外傷、風濕性關節炎與急性肺器官感染之抗炎作用。</p> <p>用法用量 對靜脈或肌肉行慢速注射。 大動物：治療的前兩天，使用20~30 mL，兩天後改用20 mL，以後則降為10 mL。 小馬小牛：前兩天10 mL，兩天後則用6 mL。 豬：每日以10~15 mL，行肌肉注射。 ※停藥期：牛：15天，其他肉類動物：3天，乳用：4次擠乳(用藥後4次之擠乳，不得供人食用)。</p>
<p>處 方 藥 別</p>	<p>第二類</p>	<p>第二類</p>

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

解熱鎮痛消炎劑

Antipyretics & Analgesics

<p>產 品</p>		
<p>製 品 編 號</p>	<p>N611056</p>	<p>N121076</p>
<p>品 名</p>	<p>特威鎮注射劑[®] Tolvetin[®] Injection 100mL/12vial</p>	<p>福力鎮 5%長效注射劑[®] Fluliten[®] Injection 100mL/10vial</p>
<p>成 份</p>	<p>Each mL contains : Tolfenamic acid....40mg</p>	<p>Each mL contains: Flunixin (Meglumine type).....50mg</p>
<p>說 明</p>	<p>適應症 本劑為一消炎、鎮痛、解熱劑。 牛：併用治療呼吸疾病相關之急性炎症及急性乳房炎。 豬：併用治療子宮炎、乳房炎及無乳症徵候群。</p> <p>用法用量 牛： 呼吸疾病：肌肉注射每公斤2毫克，相當於每20公斤1mL，48小時後再重覆施打一次。 乳房炎：單一次靜脈注射，每公斤體重4毫克。 豬：肌肉注射每公斤2毫克，相當於每20公斤體重1mL。 ※停藥期：豬：肉14天，牛：肉12天，牛奶：1天(2次擠乳後)。</p>	<p>適應症 牛：肉牛和乳牛：消炎解熱，亦可用於內毒素休克。強效鎮痛，特別是腸絞痛。有效抑制分泌過盛。 豬：消炎鎮痛，針對母豬之乳腺炎—子宮炎—無乳症(M.M.A.)藥效最佳。</p> <p>用法用量 牛：緩慢靜脈或肌肉注射，每50公斤體重注射2mL/日或1mL/間隔12小時，最多連續治療3天。 豬：肌肉注射，每50公斤體重注射2mL/日，最多連續治療3天。 ※停藥期：牛乳：12小時，馬：10天，牛：15天，豬：21天。</p>
<p>處 方 藥 別</p>	<p>第二類</p>	<p>第二類</p>

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

消毒劑

Disinfectant

產品		
製品編號	E141615	E140267
品名	<p>安期B-25消毒劑[®] Anti B-25[®] Solution</p> <p style="text-align: right;">4L</p>	<p>百潔碘-30消毒劑[®] Biodyne-30[®] Solution</p> <p style="text-align: right;">3.8L</p>
成份	<p>Each mL contains : Benzalkonium Chloride....250mg</p>	<p>Each mL contains : Available Iodine (Nonoxynol-9 Iodine 20%)....30mg</p>
說明	<p>適應症</p> <p>本品主成份Benzalkonium Chloride 是一種陽離子界面活性劑，為目前最理想的消毒劑之一，在各國藥典及其他重要醫藥書籍中，均有詳細記載與推薦。可用於一般消毒、傷口沖洗、殺菌及消除黴菌、病毒的感染。</p> <p>消毒殺菌劑、雞舍、豬舍、畜體、水池、鰻池、農牧場舍、手術器具之清潔殺菌消毒。</p> <p>用法用量</p> <p>畜舍消毒：800~1200倍噴洗。 器皿消毒：500~1000倍浸洗。 水池消毒：2000~4000倍。</p>	<p>適應症</p> <p>本品適用於禽、畜舍之豬傳染性胃腸炎(TGE)、傳染性支氣管炎(IB)、慢性呼吸器病(CRD)、新城雞病(ND)、假性狂犬病(PR)、豬水泡病(SVD)等病原、畜體、禽畜用器具等之消毒。</p> <p>用法用量</p> <p>稀釋倍數，請詳閱說明書。</p>
處方藥別		

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

消毒劑

Disinfectant

產品		
製品編號	E091248	E140092
品名	碘浴寶消毒液 [®] Iodiper [®] Solution 5L	碘浴寶消毒液 [®] Iodiper [®] Solution 20L
成份	Each mL contains : Available Iodine(povidone-Iodine)....5mg Glycerin....100mg	Each mL contains : Available Iodine(povidone-Iodine)....5mg Glycerin....100mg
說明	<p>適應症</p> <p>在乳牛的乳房炎防治計劃中，用於乳頭浸浴或噴霧消毒、乳房清洗及擠乳人員手部的消毒並控制乳頭之潰爛。</p> <p>用法用量</p> <p>1.本品為一現成的乳頭浸浴溶液，不需稀釋，即可做為乳頭浸浴或噴霧。</p> <p>2.乳房清洗：(75ml本溶液加4公升清水)擠奶時使用上述稀釋液消毒清洗乳房用水。擦洗乳房用器材，紙巾較布質者為佳。</p> <p>3.手的消毒：(75ml本溶液加4公升清水)擠奶前擠乳工人應用上述稀釋溶液做手部浸浴消毒，最好能戴上橡皮手套。</p>	<p>適應症</p> <p>在乳牛的乳房炎防治計劃中，用於乳頭浸浴或噴霧消毒、乳房清洗及擠乳人員手部的消毒並控制乳頭之潰爛。</p> <p>用法用量</p> <p>1.本品為一現成的乳頭浸浴溶液，不需稀釋，即可做為乳頭浸浴或噴霧。</p> <p>2.乳房清洗：(75ml本溶液加4公升清水)擠奶時使用上述稀釋液消毒清洗乳房用水。擦洗乳房用器材，紙巾較布質者為佳。</p> <p>3.手的消毒：(75ml本溶液加4公升清水)擠奶前擠乳工人應用上述稀釋溶液做手部浸浴消毒，最好能戴上橡皮手套。</p>
處方藥別		

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

營養代謝

Nutritional supplement

<p>產 品</p>		
<p>製 品 編 號</p>	<p>E081625</p>	<p>E101398</p>
<p>品 名</p>	<p>美極命-G注射液® Methimin-G® Injection 100mL/10vial</p>	<p>維畜鈣注射液® Polycalcium® Injection 100mL/10vial</p>
<p>成 份</p>	<p>Each 100mL contains : DL-Methionine N.F.2.5gm Thiamine Hydrochloride(B1) U.S.P25mg Riboflavin(B2) J.P.10mg Dextrose U.S.P10gm</p>	<p>Each mL contains : Calcium Gluconate....500 mg</p>
<p>說 明</p>	<p>適應症 維持肝臟正常功能、解毒、食慾不振、消除疲勞、酸中毒、腹水、浮腫。</p> <p>用法用量 牛、馬(大)：100~250mL 牛、馬(中)：50~100mL 牛、馬(小)：30~50mL 豬、羊、犬(大)：20~30mL 豬、羊、犬(中)：10~20mL 豬、羊、犬(小)：3~10mL 或按體重每公斤0.6mL，每日一次，行靜脈或肌肉注射；必要時視症狀增加劑量及次數並連續使用。</p>	<p>適應症 低血鈣、乳熱、四肢搖弱、缺鈣麻痺、產乳麻痺。過敏性、中毒性及神經性疾患鈣代謝障礙、佝僂症、骨質軟化症、酮尿症、新生動物機能萎縮。一般代謝障礙、分娩無力。農藥、四氯化碳、鉛、氟、氰、草酸、酒石酸、有機氯、殺蟲劑及其它化學藥品中毒，或肝損傷之預防及輔助治療。</p> <p>用法用量 牛、馬(500kg↑)：90~125mL，牛、馬(100~500kg)：30~90mL，犢牛、小馬：20~30mL，羊：20~30mL，視症狀增減劑量，行皮下、肌肉或靜脈注射。豬：20~30mL，皮下注射。仔豬：2~3mL，皮下注射。犬：2~4mL，肌肉或靜脈注射。貓：0.5~3mL，肌肉注射。</p>
<p>處 方 藥 別</p>	<p>第二類</p>	<p>第二類</p>

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

營養代謝

Nutritional supplement

<p>產 品</p>		
<p>製品 編號</p>	<p>E091547</p>	<p>N091924-60</p>
<p>品 名</p>	<p>複方維他命B注射液[®] Vitalex[®] Injection 100mL/10vial</p>	<p>通血能200注射劑[®] Tonkey 200[®] Injection 100mL/5vial</p>
<p>成 份</p>	<p>Each mL contains : Thiamine Hydrochloride....100 mg Riboflavin....5 mg Pyridoxine Hydrochloride....5 mg Niacinamide....50 mg D-Panthenol....5 mg</p>	<p>Each mL contains : Iron Dextran eq. to Iron....200mg</p>
<p>說 明</p>	<p>適應症 口內炎、神經炎、營養失調、貧血、疲勞、營養補給，及維他命B1、B2及B6缺乏諸症。</p> <p>用法用量 小豬(40公斤以下)：1~2 mL。 中豬(40~75公斤)：2~3 mL。 大豬(75公斤以上)：3~5 mL。 牛馬：1~10 mL。 幼牛馬、綿羊、山羊：1~5 mL。 貓、狗、兔：1~2 mL。 行皮下、肌肉或靜脈注射。</p>	<p>適應症 豬：仔豬的缺鐵性貧血。</p> <p>用法用量 腿深部肌肉注射鐵的劑量如下： 豬：每頭仔豬以100至200毫克的劑量，給予一次或每隔幾日給予。 劑量可以根據症狀適當的增減調整。</p>
<p>處方 藥別</p>	<p>第二類</p>	<p>第二類</p>

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

營養代謝

Nutritional supplement

<p>產 品</p>			
<p>製品 編號</p>	<p>N452509-60</p>	<p>N452516-60</p>	
<p>品 名</p>	<p>鈣立飲散劑[®] Cow Glucon Powder[®] Powder 400gmx30Bag/Box</p>	<p>鈣立飲粒料[®] Cow Glucon Pellet[®] Pellet 20kg/Bag</p>	
<p>成 份</p>	<p>主成分:葡萄糖酸、磷酸二氫鈉 賦形劑:檸檬酸、甘草提取物、甜菊提取物、糊精</p>	<p>主成分:葡萄糖酸鈣、氧化鎂、硫酸鐵、硫酸鋅、硫酸銅、硫酸錳、硫酸鈷、碘酸鈣、丙酸鈣 賦形劑:麥麩、小麥粉、磷酸氫鈣、米糠油渣、小麥酒糟(DDGS) 主要成分: 每公斤含有: 鈣(Ca) 50gm 鎂(Mg) 60gm 磷(P) 30gm</p>	
<p>說 明</p>	<p>適應症 乳牛分娩後迅速補充鈣。</p> <p>用法用量 1.將本品一袋(400gm)溶解於60°C~70°C的1~2公升熱水中，或者溶解於40°C左右的6~10公升熱水中，餵飼給分娩結束的每頭母牛。 2.如果擔心分娩後的缺鈣，可增加1~2次餵飼。 ※如果未達到上述規定量，可與味噌混合並使其飲用足夠的水分。</p>	<p>適應症 牛:含鈣成分，補充均衡的必需礦物質。</p> <p>用法用量 請按照下列數量添加至每天每頭的飼料中。 1.泌乳牛: 100~300gm (分娩後7-10天)。 2.懷孕牛: 50~150gm (每月餵飼7-10天，直到分娩前7天)。 3.育成牛: 30~50gm (每月餵飼7-10天)。 4.育肥牛: 30~50gm (上市2個月前，每月餵飼10天)。</p>	
<p>處方 藥別</p>			

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

荷爾蒙

Hormones

<p>產 品</p>		
<p>製 品 編 號</p>	<p>E611947-60</p>	<p>E614561-60</p>
<p>品 名</p>	<p>催產素注射劑[®] Oxytocin[®] Injection</p>	<p>催產素注射劑[®] Oxytocin[®] Injection</p>
<p>成 份</p>	<p>10mL/12vial</p> <p>Each mL contains : Oxytocin Synthetic.....10Units</p>	<p>50mL/20vial</p> <p>Each mL contains : Oxytocin Synthetic.....10units</p>
<p>說 明</p>	<p>適應症 刺激子宮、增強分娩時子宮之收縮力，預防產後出血及產後子宮鬆弛；治療分娩時子宮收縮無力、子宮出血及產後子宮收縮不全。</p> <p>用法用量 牛、馬：5~10 mL。 豬、羊：3~5mL。 犬、貓：0.1~1.5mL。 ※使用本劑時，應在母畜子宮頸已擴張後才能注射，否則易導致子宮破裂。施行肌肉或皮下注射。</p>	<p>適應症 刺激子宮、增強分娩時子宮之收縮力，預防產後出血及產後子宮鬆弛；治療分娩時子宮收縮無力、子宮出血及產後子宮收縮不全。</p> <p>用法用量 牛、馬：5~10mL。 豬、羊：3~5mL。 犬、貓：0.1~1.5mL。 ※使用本劑時，應在母畜子宮頸已經擴張後才能注射，否則易導致子宮破裂。施行肌肉或皮下注射。</p>
<p>處 方 藥 別</p>	<p>第一類</p>	<p>第一類</p>

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

精神安定劑

Tranquilizers

產品	
製品編號	N161238
品名	畜舒坦® Stroless® Injection 100mL/5vial
成份	Each mL contains : Azaperone....40mg
說明	<p>適應症</p> <p>專用於控制豬精神安定方面：包括豬的狂燥、興奮時鎮靜、移動、運輸或併欄時爭鬥防止及情緒緩和。</p> <p>※ 肌肉注射時應使用消毒過之長注射針在耳根後垂直注射或深入後腿，以避免因用法不正確或用量不足而導致效果不良。</p> <p>用法用量</p> <p>攻擊性母豬：1mL/20kg，I.M.</p> <p>緊迫之預防及緩解：0.5~1mL/20kg，I.M.</p> <p>公豬載運：0.5mL/20kg，I.M</p> <p>急性心衰竭：1mL/100kg，I.M.</p> <p>※ 停藥期：7天。</p>
處方藥別	第一類

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

治療用散劑

Therapeutic powder

產品		
製品編號	E001524	E001672
品名	<p>安蒙西林20%[®] Amoxicillin W.S.P 20%[®] W.S.Powder</p> <p style="text-align: right;">20kg/Bag</p>	<p>安蒙西林20%[®] Amoxicillin W.S.P 20%[®] W.S.Powder</p> <p style="text-align: right;">1kg/Bag</p>
成份	<p>Each kg contains :</p> <p>Amoxicilline Trihydrate....200gm(potency)</p>	<p>Each kg contains :</p> <p>Amoxicilline Trihydrate....200gm(potency)</p>
說明	<p>適應症</p> <p>雞(不含產蛋中之蛋雞)：治療大腸桿菌症、沙氏桿菌症、細菌性下痢及傳染性鼻炎。豬、仔牛：治療大腸桿菌感染症、沙門氏菌感染症、赤痢、肺炎雙球菌感染症、嗜血桿菌性肺炎、巴氏桿菌症、萎縮性鼻炎、丹毒、膿腫、腦膜炎等。</p> <p>用法用量</p> <p>雞(不含產蛋中之蛋雞)：使用本產品100公克溶於400公升水中飲用，使用2-3天。豬：每公斤體重使用本劑50mg，一天兩次，連續使用3-5天泡於水中飲用，或直接灌食。每噸飼料添加本劑1,875-2,250公克，一天餵食劑量相當於每公斤體重15毫克。治療期5天。仔牛：每公斤體重使用本劑12mg，泡於水中飲用或灌食。</p> <p>※停藥期：豬：15天，牛：20天，雞：5天。</p>	<p>適應症</p> <p>雞(不含產蛋中之蛋雞)：治療大腸桿菌症、沙氏桿菌症、細菌性下痢及傳染性鼻炎。豬、仔牛：治療大腸桿菌感染症、沙門氏菌感染症、赤痢、肺炎雙球菌感染症、嗜血桿菌性肺炎、巴氏桿菌症、萎縮性鼻炎、丹毒、膿腫、腦膜炎等。</p> <p>用法用量</p> <p>雞(不含產蛋中之蛋雞)：使用本產品100公克溶於400公升水中飲用，使用2-3天。豬：每公斤體重使用本劑50mg，一天兩次，連續使用3-5天泡於水中飲用，或直接灌食。每噸飼料添加本劑1,875-2,250公克，一天餵食劑量相當於每公斤體重15毫克。治療期5天。仔牛：每公斤體重使用本劑12mg，泡於水中飲用或灌食。</p> <p>※停藥期：豬：15天，牛：20天，雞：5天。</p>
處方藥別	第三類	第三類

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

治療用散劑

Therapeutic powder

<p>產 品</p>		
<p>製 品 編 號</p>	<p>N000065</p>	<p>E001380</p>
<p>品 名</p>	<p>安蒙西林50%[®] Amoxicillin W.S.P 50%[®] W.S.Powder 20kg/Bag</p>	<p>安蒙西林50%[®] Amoxicillin W.S.P 50%[®] W.S.Powder 1kg/Bag</p>
<p>成 份</p>	<p>Each kg contains : Amoxicilline Trihydrate....500gm(potency)</p>	<p>Each kg contains : Amoxicilline Trihydrate....500gm(potency)</p>
<p>說 明</p>	<p>適應症 雞、火雞(不含蛋雞)：治療大腸桿菌症、沙門氏菌症、慢性呼吸器病、傳染性鼻炎、細菌性下痢。 豬：治療大腸桿菌症、沙門氏菌症、嗜血桿菌性肺炎、巴氏桿菌症、萎縮性鼻炎、丹毒、膿腫、腦膜炎等。</p> <p>用法用量 豬：每公斤體重使用本劑20mg，一天兩次，連續使用3~5天泡於水中飲用，或直接灌食。每噸飼料添加本劑750-900公克，一天餵食劑量相當於每公斤體重15毫克。治療期5天。 雞、火雞(不含蛋雞)：使用本劑100公克溶於1噸水中飲用，使用2~3天。 ※停藥期：雞：5天，豬：15天。</p>	<p>適應症 雞、火雞(不含蛋雞)：治療大腸桿菌症、沙門氏菌症、慢性呼吸器病、傳染性鼻炎、細菌性下痢。 豬：治療大腸桿菌症、沙門氏菌症、嗜血桿菌性肺炎、巴氏桿菌症、萎縮性鼻炎、丹毒、膿腫、腦膜炎等。</p> <p>用法用量 豬：每公斤體重使用本劑20mg，一天兩次，連續使用3~5天泡於水中飲用，或直接灌食。每噸飼料添加本劑750-900公克，一天餵食劑量相當於每公斤體重15毫克。治療期5天。 雞、火雞(不含蛋雞)：使用本劑100公克溶於1噸水中飲用，使用2~3天。 ※停藥期：雞：5天，豬：15天。</p>
<p>處 方 藥 別</p>	<p>第三類</p>	<p>第三類</p>

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

治療用散劑

Therapeutic powder

<p>產 品</p>		
<p>製品 編號</p>	<p>P610569</p>	<p>P611285</p>
<p>品 名</p>	<p>賜福素散® Cephalin® W.S.Powder 20kg/Bag</p>	<p>賜福素散® Cephalin® W.S.Powder 1kg/Bag</p>
<p>成 份</p>	<p>Each gm contains : Cephalexin Monohydrate....150mg(potency)</p>	<p>Each gm contains : Cephalexin Monohydrate....150mg(potency)</p>
<p>說 明</p>	<p>適應症 治療犬、貓、猴對本劑具有感受性細菌，尤其對配尼西林有抗藥性之葡萄球菌引起之感染。雞：傳染性可利查、支氣管炎、慢性呼吸器病、葡萄球菌感染。豬：細菌性肺炎、肺疫、豬丹毒、子宮內膜炎、產褥熱。</p> <p>用法用量 犬、貓：每公斤體重投與本劑200mg即含Cephalexin 30mg力價，經口投與，每日二次。 雞、豬：每公升飲水添加本藥300~600mg。猴：每公斤體重投與本劑166.7mg~333.4mg即含Cephalexin 25mg~50mg力價，經口投與，每日二次。 雞16週齡以上不得使用，產蛋中之蛋雞不得使用。 ※本劑不可連續使用7天以上，停藥期：2天。</p>	<p>適應症 治療犬、貓、猴對本劑具有感受性細菌，尤其對配尼西林有抗藥性之葡萄球菌引起之感染。雞：傳染性可利查、支氣管炎、慢性呼吸器病、葡萄球菌感染。豬：細菌性肺炎、肺疫、豬丹毒、子宮內膜炎、產褥熱。</p> <p>用法用量 犬、貓：每公斤體重投與本劑200mg即含Cephalexin 30mg力價，經口投與，每日二次。 雞、豬：每公升飲水添加本藥300~600mg。猴：每公斤體重投與本劑166.7mg~333.4mg即含Cephalexin 25mg~50mg力價，經口投與，每日二次。 雞16週齡以上不得使用，產蛋中之蛋雞不得使用。 ※本劑不可連續使用7天以上，停藥期：2天。</p>
<p>處方 藥別</p>	<p>第三類</p>	<p>第三類</p>

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

治療用散劑

Therapeutic powder

產品		
製品編號	N000656	E001005
品名	<p>可立使淨-110[®] Colistin-110[®] Powder</p> <p style="text-align: right;">20kg/Bag</p>	<p>林可黴素-110[®] Lincomycin-110[®] Powder</p> <p style="text-align: right;">20kg/Bag</p>
成份	<p>Each gm contains :</p> <p>Colistin sulfate.....110mg(potency)</p>	<p>Each kg contains :</p> <p>Lincomycin HCL....110 gm (potency)</p>
說明	<p>適應症 治療牛、豬，對本劑具有感受性細菌(沙氏桿菌，大腸桿菌)引起之下痢。</p> <p>用法用量 牛：依每日每公斤體重經口投予本劑18~45mg。 豬：依每日每公斤體重經口投予本劑36~90mg。 ※停藥期：3天。</p>	<p>適應症 豬：治療對本劑有感受性豬赤痢螺旋體引起的感染。</p> <p>用法用量 每噸飼料添加本品0.4~1kg(44~110ppm)，連續使用5~10天。 ※ 停藥期：4天。</p>
處方藥別	第三類	第三類

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

治療用散劑

Therapeutic powder

產品		
製品編號	N000041	E001665
品名	林可黴素-220 [®] Lincomycin-220 [®] Powder 20kg/Bag	林可黴素 40% [®] Lincomycin 40% [®] W.S.Powder 1kg/Bag
成份	Each kg contains : Lincomycin HCL....220 gm (potency)	Each kg contains : Lincomycin HCL....400 gm (potency)
說明	<p>適應症 豬：治療對本劑有感受性豬赤痢螺旋體引起的感染。</p> <p>用法用量 每噸飼料添加本品0.2~0.5kg(44~110ppm)，連續使用5~10天。 ※ 停藥期：4天。</p>	<p>適應症 豬：治療赤痢 肉雞：治療壞死性腸炎</p> <p>用法用量 豬：每4.5公升飲水添加相當於250 mg的Lincomycin，連續最多授予10天。 雞：每公升飲水添加相當於16.9 mg的Lincomycin，連續使用7天。 ※ 停藥期：豬：1天，雞：2天。</p>
處方藥別	第三類	第三類

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

治療用散劑

Therapeutic powder

產品		
製品編號	N000405	N000883
品名	可賜興-666 [®] Cotusin-666 [®] W.S.Powder 750gm/Tin	多欣-200 [®] Doxin-200 [®] W.S.Powder 1kg/Bag
成份	Each 150g contains : Lincomycin HCL....33.3gm(potency) Spectinomycin HCL....66.7gm(potency)	Each gm contains : Doxycycline Hyclate....200 mg (potency)
說明	<p>適應症</p> 豬：治療赤痢、細菌性下痢及黴漿菌性肺炎。 雞：治療慢性呼吸器病及葡萄球菌症。 <p>用法用量</p> 豬：每200公升飲水添加本藥19公克。 雞：每200公升飲水添加本藥75公克。 <ol style="list-style-type: none"> 1. 本劑不可與紅黴素同時使用。 2. 雞16週齡以上不得使用，產蛋中之蛋雞不得使用。 ※停藥期：8天。	<p>適應症</p> 治療家禽CRD及併發症如：可利查、家禽霍亂；治療豬細菌性肺炎及大腸桿菌感染症。 <p>用法用量</p> 添加於飲水中，劑量為50ppm，即1噸水中添加本劑250公克。 雞16週齡以上不得使用，產蛋中之蛋雞不得使用。 ※停藥期：3天。
處方藥別	第三類	第三類

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

治療用散劑

Therapeutic powder

<p>產 品</p>		
<p>製 品 編 號</p>	<p>N171552</p>	<p>N000151</p>
<p>品 名</p>	<p>肥力王-VN[®] Feradox-VN[®] W.S.Powder 460gm/Bag</p>	<p>獲利欣 1%[®] Floricin 1%[®] Powder 20kg/Bag</p>
<p>成 份</p>	<p>每公斤含有： Neomycin Sulfate...11.628g Vit.A...1,395,349I.U.，Vit.D3...465,116I.U. Vit.K...1.163g，Vit.E...744 I.U.，Vit.B1...0.465g Vit.B2...1.395g，Vit.B12...6.977mg，Vit.B5...9.302g Fe...15.4 g，Cu...0.465g</p>	<p>Each kg contains： Florfenicol...10 gm</p>
<p>說 明</p>	<p>適應症 治療仔豬細菌性腸炎及貧血。</p> <p>用法用量 豬： 1. 每天每窩(10隻)20日齡內仔豬使用量：每1公升飲水添加23公克口服投予。 2. 每天每窩(10隻)20日齡以上仔豬使用量：每2公升飲水添加23公克口服投予。</p>	<p>適應症 豬: 治療放線桿菌胸膜肺炎、巴氏桿菌肺炎、沙氏桿菌症、大腸桿菌及其他對本劑具有感受性之細菌所引起之感染。 土番鴨(不含產蛋中之蛋鴨): 治療水禽雷氏桿菌之感染症。</p> <p>用法用量 豬: 每噸飼料添加本劑2~4公斤，或每公斤體重投與本劑0.1~0.2公克(相當於Florfenicol 1~2毫克)。 土番鴨：每公斤體重投與本品4公克(相當於Florfenicol 40毫克)，每天一次，連續使用5天。 ※停藥期：豬：3天，土番鴨：14天。</p>
<p>處 方 藥 別</p>	<p>第三類</p>	<p>第三類</p>

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

治療用散劑

Therapeutic powder

產品		
製品編號	N000711	N000577
品名	<p>獲利欣10%[®] Floricin 10%[®] Powder</p> <p style="text-align: right;">10kg/Bag</p>	<p>經四環素-220[®] Oxytetracycline-220[®] Powder</p> <p style="text-align: right;">25kg/Bag</p>
成份	<p>Each kg contains :</p> <p>Florfenicol....100 gm</p>	<p>Each kg contains :</p> <p>Oxytetracycline Base....220 gm (potency)</p>
說明	<p>適應症</p> <p>豬: 治療放線桿菌胸膜肺炎、巴氏桿菌肺炎、沙氏桿菌症、大腸桿菌及其他對本劑具有感受性之細菌所引起之感染。 土番鴨(不含產蛋中之蛋鴨): 治療水禽雷氏桿菌之感染症。</p> <p>用法用量</p> <p>豬: 每噸飼料添加本劑0.2~0.4公斤, 或每公斤體重投與本劑0.01~0.02公克(相當於Florfenicol 1~2毫克)。 土番鴨: 每公斤體重投與本品0.4公克(相當於Florfenicol 40毫克), 每天一次, 連續使用5天。 ※ 停藥期: 豬: 3天, 土番鴨: 14天。</p>	<p>適應症</p> <p>雞、火雞、鴨(不含產蛋中之蛋禽): 治療包括大腸桿菌敗血症、家禽霍亂、雛白痢、鴨敗血症、臍炎、傳染性鼻炎及慢性呼吸器病。豬: 治療呼吸道及腸道細菌性下痢, 如萎縮性鼻炎、黴漿菌肺炎、放線桿菌胸膜肺炎(APP)、細菌性腸炎、增殖性腸病極大腸桿菌、沙氏桿菌感染症。犢羊、犢牛: 治療呼吸道、敗血症及腸道感染, 包括由沙氏桿菌和巴氏桿菌引起的感染。</p> <p>用法用量</p> <p>雞、火雞、鴨(不含產蛋中之蛋禽): 每公噸飼料添加0.5~0.9公斤。豬: 每公噸飼料添加0.5~0.9公斤。犢羊、犢牛: 每公噸飼料添加2.7公斤。 ※ 停藥期: 5天。</p>
處方藥別	第三類	第三類

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

治療用散劑

Therapeutic powder

產品		
製品編號	N000216	N001190
品名	經四環素-500 [®] Oxytetracycline-500 [®] W.S.Powder 1kg/Bag	氯多欣散劑 [®] Chlordoxin 15.4% Powder [®] Powder 25kg/Bag
成份	Each gm contains : Oxytetracycline HCL.....500 mg (potency)	Each kg contains : Chlortetracycline calcium Eq. to Chlortetracycline hydrochloride.....154gm
說明	<p>適應症 治療豬具感性細菌感染所引起的腸炎及肺炎；治療雞具感性細菌感染所引起的慢性呼吸器病、傳染性可利查及下痢。</p> <p>用法用量 豬：每10公升飲水添加本劑2公克，連續使用3~5天。 雞：每10公升飲水添加本劑2公克，連續使用3~5天。 雞16週齡以上不得使用，產蛋中之蛋雞不得使用。 ※ 停藥期：3天。</p>	<p>適應症 雞：治療對本劑有感受性之大腸桿菌感染症。 豬：治療對本劑有感受性之鉤端螺旋體所引起之感染症。</p> <p>用法用量 雞(不含產蛋中之蛋雞)：連續使用本劑5日。 豬：連續使用本劑14日。 注意事項：雞16週齡以上不得使用，產蛋中之蛋禽不得使用。 ※ 停藥期：2天。</p>
處方藥別	第三類	第三類

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

治療用散劑

Therapeutic powder

產品		
製品編號	N000443	E001586
品名	泰康欣-200 [®] Tiacosin-200 [®] Powder 10kg/Bag	泰康欣 250 [®] Tiacosin 250 [®] Solution 480 mL/Btl
成份	Each kg contains: Tilmicosin phosphate....200 gm (potency)	Each mL contains : Tilmicosin phosphate eq. to Tilmicosin 250mg (potency)
說明	<p>適應症 控制由放線桿菌(Actinobacillus Pleuropneumoniae)，黴漿菌(Mycoplasma Hyopneumoniae)，巴斯德桿菌(Pasteurella Multocida)或其它對Tilmicosin敏感的微生物所引起的肺炎。</p> <p>用法用量 治療肥育期豬隻肺炎： 2kg/每噸飼料，連續餵食14天。 ※ 停藥期：14天。</p>	<p>適應症 豬：對因Mycoplasma hyopneumoniae、Pasteurella multocida、Actinobacillus pleuropneumoniae、Actinomyces pyogenes所引起的豬呼吸道疾病之治療。 雞(不含產蛋中之蛋雞)：對因Mycoplasma gallisepticum以及M. synoviae所引起的雞呼吸道疾病之治療。</p> <p>用法用量 豬：100公升的飲水中加入81毫升的泰康欣濃縮液，且連續使用5天。雞(不含產蛋中之蛋雞)：100公升的飲水中加入30毫升的泰康欣濃縮液，且連續使用3天。藥用飲水應每24小時更新，以確保新鮮。 雞16週齡以上不得使用，產蛋中之蛋雞不得使用。 ※停藥期：豬：14天。雞：12天。</p>
處方藥別	第三類	第三類

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

治療用散劑

Therapeutic powder

<p>產 品</p>		
<p>製品 編號</p>	<p>N000742</p>	<p>N170850</p>
<p>品 名</p>	<p>泰樂新AT-50散劑[®] Tylosin AT-50[®] Powder</p> <p>10kg/Bag</p>	<p>泰利美寧[®] Trimerin[®] Powder</p> <p>1kg/Bag</p>
<p>成 份</p>	<p>Each gm contains : Acetylisovaleryltylosin tartrate.....50mg(potency)</p>	<p>Each gm contains : Sulfadimethoxine....400 mg Trimethoprim....80 mg</p>
<p>說 明</p>	<p>適應症 治療豬地方性肺炎、黴漿菌性關節炎、鼻炎。 治療雞(不含蛋雞)慢性呼吸器病、黴漿菌、葡萄球菌及鏈球菌感染症。</p> <p>用法用量 每噸飼料添加0.4~1公斤，視病情連續使用5~7天。 ※停藥期：豬：3天，雞：5天。</p>	<p>適應症 豬：各種細菌性下痢、黃白痢、MMA綜合症、細菌性肺炎、關節炎、鼻炎。 雞：細菌性下痢、白痢、傳染性可利查、家禽霍亂、大腸桿菌症。</p> <p>用法用量 治療： 每噸飼料添加本品400gm 雞16週齡以上不得使用·產蛋中之蛋雞不得使用。 ※ 停藥期：15天。</p>
<p>處方 藥別</p>	<p>第三類</p>	<p>第三類</p>

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

含藥物飼料添加劑

Medicated feed additives

產品		
製品編號	N000498	P611199
品名	<p>中化泰妙素 20%[®] C.C.P.C. Tiamulin 20%[®] Powder</p> <p style="text-align: right;">1kg/Bag</p>	<p>中化泰妙素 20%[®] C.C.P.C. Tiamulin 20%[®] Powder</p> <p style="text-align: right;">20kg/Bag</p>
成份	<p>Each kg contains :</p> <p>Tiamulin hydrogen fumarate....200gm(potency)</p>	<p>Each kg contains :</p> <p>Tiamulin hydrogen fumarate....200gm(potency)</p>
說明	<p>適應症</p> <p>豬：傳染性肺炎與呼吸道感染及豬赤痢的治療。 雞：治療慢性呼吸道疾病混合感染症、傳染性鼻竇炎等疾病。 ※請勿與抗球蟲劑Monensin、Narasin、Salinomycin併用，以防毒性發生。</p> <p>用法用量</p> <p>豬： 流行性肺炎：添加1kg/每噸飼料，連續使用5~7天。 豬赤痢：添加0.5kg/每噸飼料，連續使用3~6天。 雞：每噸飼料添加1~2公斤，連續使用3~5天。 ※ 停藥期：7天。</p>	<p>適應症</p> <p>豬：傳染性肺炎與呼吸道感染及豬赤痢的治療。 雞：治療慢性呼吸道疾病混合感染症、傳染性鼻竇炎等疾病。 ※請勿與抗球蟲劑Monensin、Narasin、Salinomycin併用，以防毒性發生。</p> <p>用法用量</p> <p>豬： 流行性肺炎：添加1kg/每噸飼料，連續使用5~7天。 豬赤痢：添加0.5kg/每噸飼料，連續使用3~6天。 雞：每噸飼料添加1~2公斤，連續使用3~5天。 ※ 停藥期：7天。</p>
處方藥別	第三類	第三類

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

含藥物飼料添加劑

Medicated feed additives

產品	
製品編號	E003007
品名	泰黴素-220 [®] Tylosin-220 [®] Powder 20kg/Bag
成份	Each kg contains : Tylosin phosphate....220 gm (potency)
說明	<p>適應症</p> <p>雞：促進生長及改進飼料利用效率 產蛋雞：改進飼料利用效率 豬：1. 可預防豬赤痢，2. 促進生長及改進飼料利用效率</p> <p>用法用量</p> <p>雞：每噸飼料添加20~250公克。 產蛋雞：每噸飼料添加100~250公克。 豬：1. 預防豬赤痢：每噸飼料添加454~500公克連續餵飼3週後，改用200公克至出售。2. 促進生長及改進飼料利用效率：(1) 體重60kg以上的豬：每噸飼料添加50~100公克，(2) 體重30~60kg的豬：每噸飼料添加100~200公克，(3) 體重10~30kg的豬：每噸飼料添加100~500公克。</p>
處方藥別	

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

其他製劑

Other preparations

產品		
製品編號	N000113	N000319
品名	克嗽靈® Cousorin® Powder 1kg/Bag	克嗽靈® Cousorin® Powder 20kg/Bag
成份	Each gm contains : Chlorpheniramine Maleate....5mg DL-Methyl Ephedrine HCL....10mg Guaiacol Glyceryl Ether....10mg Dextromethorphan HBr....1mg Caffeine....20mg	Each g contains : Chlorpheniramine Maleate....5mg DL-Methyl Ephedrine HCL....10mg Guaiacol Glyceryl Ether....10mg Dextromethorphan HBr....1mg Caffeine....20mg
說明	<p>適應症 豬、雞：治療因支氣管炎、咽喉炎、感冒、急慢性呼吸道症等疾病所引起之一般咳嗽及氣喘症狀、過敏性疾患及降低呼吸道的液體粘著力和表面張力，促進黏液的排出等。</p> <p>用法用量 豬：混合於飼料中供服，按體重每6公斤服用本劑1公克，每天1~2次，重症者可酌予增加。 雞：每噸飲水添加本劑0.5~1公斤，每天1~2次，重症者可酌予增加。</p>	<p>適應症 豬、雞：治療因支氣管炎、咽喉炎、感冒、急慢性呼吸道症等疾病所引起之一般咳嗽及氣喘症狀、過敏性疾患及降低呼吸道的液體粘著力和表面張力，促進黏液的排出等。</p> <p>用法用量 豬：混合於飼料中供服，按體重每6公斤服用本劑1公克，每天1~2次，重症者可酌予增加。 雞：每噸飲水添加本劑0.5~1公斤，每天1~2次，重症者可酌予增加。</p>
處方藥別	第一類	第一類

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

其他製劑

Other preparations

產品		
製品編號	P611450	E451509
品名	長生精精液稀釋劑 [®] Semengra Semen Extender [®] Powder 25gm*2Bag	速保精II精液稀釋液 [®] Sperm-up II [®] Solution 500mL/20Btl
成份		
說明	<p>適應症 公豬精液稀釋及延長精液保存時間。</p> <p>用法用量 請詳閱說明書。</p>	<p>適應症 公豬精液稀釋及延長精液保存時間。</p> <p>用法用量 請詳閱說明書。</p>
處方藥別		

牛、豬用藥品

Drugs for Pigs and Cattle

其他製劑

Other preparations

產品	
製品編號	N131125
品名	賜滅痢注射液 [®] Smelin [®] Injection 100mL/10vial
成份	Each mL contains : Benzetimide hydrochloride equivalent to Benzetimide....0.15mg
說明	<p>適應症 牛、羊、豬、狗下痢症狀之治療。</p> <p>用法用量 牛、羊：每10公斤體重肌肉注射1mL最高投予量為20mL。 豬、狗：每2.5公斤體重肌肉注射1mL。 如有必要時，可每隔24小時後，重複注射Benzetimide治療。</p>
處方藥別	第一類



中國化學製藥（股）公司

CCPC <http://www.ccpc.com.tw>



中國化學製藥股份有限公司

總公司：台北市中正區襄陽路23號

電話：(02)2312-4200

動物用產品事業處

地址：台南市官田區工業西路46號

電話：(06)6986691

email：jason-wang@ccpc.com.tw

訂貨專線：(06)698-6694~5

傳真：(06)6935031